

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Maviret®

AbbVie AG

Che cos'è Maviret e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Maviret è un medicamento antivirale per il trattamento di adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età affetti da epatite C contratta di recente (acuta) o di lunga durata (cronica). L'epatite C è una malattia infettiva del fegato causata dal virus dell'epatite C. Maviret contiene i principi attivi glecaprevir e pibrentasvir.

I principi attivi di Maviret bloccano la proliferazione del virus dell'epatite C e, di conseguenza, l'infezione di nuove cellule. In questo modo è possibile eliminare l'infezione dall'organismo.

Quando non si può usare Maviret?

Maviret non può essere usato

- se lei ha un'allergia a glecaprevir, pibrentasvir o ad uno degli altri componenti di questo medicamento (vedere «Cosa contiene Maviret?»);
- se ha gravi problemi di fegato non causati dall'epatite C;
- se usa uno dei medicinali elencati nella tabella seguente. Infatti, nel caso in cui Maviret fosse assunto insieme a questi medicinali, potrebbero verificarsi effetti gravi o in grado di mettere a rischio la vita. Questi medicinali possono interferire con la modalità d'azione di Maviret e, viceversa, anche Maviret può interferire con la modalità d'azione di questi medicinali.

Medicamenti che non devono essere assunti insieme a Maviret	
Medicamento o principio attivo	Indicazione del medicamento
Efavirenz, atazanavir	contro le infezioni da HIV
Rifampicina	contro le infezioni
Carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone	contro l'epilessia
Erba di San Giovanni (<i>Hypericum perforatum</i>)	medicamento su base vegetale contro i disturbi d'ansia o la depressione lieve. Questo medicamento è ottenibile senza prescrizione medica.
Atorvastatina, simvastatina	per ridurre il colesterolo nel sangue
Dabigatran	per rendere fluido il sangue
Preparati contenenti etinilestradiolo (la maggior parte delle pillole combinate, degli anelli vaginali o dei cerotti ormonali per la contraccezione)	per prevenire la gravidanza



Se una di queste indicazioni la riguarda, non deve fare uso di Maviret. Se non è sicuro, prima di assumere Maviret consulti il suo medico o il suo farmacista.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Maviret?

Si rivolga al suo medico se uno dei punti seguenti la riguarda; eventualmente il suo medico le farà eseguire dei controlli più frequenti:

- ha altri problemi di fegato, diversi dall'epatite C;
- non ha mai fatto il test dell'epatite B o sa di avere attualmente o di aver avuto in passato un'infezione da virus dell'epatite B. In questo caso il suo medico la terrà eventualmente più strettamente controllata;
- ha avuto un trapianto di fegato o di reni;
- ha il diabete. Dopo che avrà iniziato ad assumere Maviret, può rendersi necessario un monitoraggio più attento della sua glicemia e/o un adeguamento dei suoi medicinali per il diabete. Alcuni pazienti hanno sofferto di un calo della glicemia dopo avere iniziato il trattamento con medicinali simili a Maviret.

Analisi del sangue

Prima, durante e dopo il trattamento con Maviret, il suo medico le farà le analisi del sangue per poter decidere se:

- deve fare uso di Maviret e per quanto tempo;
- il trattamento è stato efficace e non ha più l'epatite C.

Uso di Maviret con altri medicinali

Informi il suo medico o il suo farmacista se attualmente assume altri medicinali, se ne ha fatto uso di recente o se intende assumerne. Sono compresi anche i rimedi e i medicinali fitoterapeutici acquistati senza ricetta medica.

Alcuni medicinali non devono essere usati insieme a Maviret – vedere sopra la tabella «Medicamenti che non devono essere assunti insieme a Maviret».

Prima di assumere Maviret informi il suo medico o il suo farmacista se fa uso di uno dei medicinali elencati nella tabella seguente. Probabilmente il medico o il farmacista modificherà la posologia di questo medicamento.

Medicamenti di cui deve informare il suo medico o il suo farmacista prima di assumere Maviret	
Medicamento	Scopo del medicamento
Lovastatina, pravastatina, rosuvastatina	per ridurre il colesterolo nel sangue
Ciclosporina, tacrolimus	per deprimere l'attività del sistema immunitario
Darunavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir	contro le infezioni da HIV
Digossina, chinidina	contro i problemi cardiaci o l'ipertensione
Antagonisti della vitamina K, come warfarin o altri medicinali simili*	per rendere fluido il sangue

*Il suo medico deve probabilmente eseguire le analisi del sangue più di frequente per controllare la capacità di coagulazione del suo sangue.



Se una o più delle condizioni sopra indicate la riguardano (o se non è sicuro), si rivolga al suo medico o al suo farmacista prima di assumere Maviret.

Se le è stata diagnosticata un'intolleranza ad alcuni zuccheri, consulti il medico prima di assumere Maviret.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare Maviret durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Gli effetti di Maviret sulla gravidanza non sono noti. Se lei è incinta, sospetta di esserlo o ha intenzione di avere un bambino, l'uso di Maviret deve essere evitato. Chieda consiglio al suo medico prima di assumere questo medicamento.

Allattamento

Se allatta, informi il suo medico prima di assumere Maviret. Non è noto se i due principi attivi contenuti in Maviret passino nel latte materno umano.

Come usare Maviret?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quale quantità del medicamento si deve assumere

La dose consigliata è di tre compresse da assumere insieme una volta al giorno.

Come si deve assumere Maviret

Le compresse devono essere assunte durante i pasti. Le compresse devono essere ingerite intere. Le compresse non devono essere masticate, frantumate o divise.

Se si assume una quantità di Maviret maggiore di quella dovuta

Se ha assunto accidentalmente una dose di Maviret maggiore di quella raccomandata, contatti immediatamente il suo medico o si rivolga all'ospedale più vicino. Prenda con sé la confezione del medicamento per poter precisare meglio che cosa ha ingerito.

Se si dimentica di assumere Maviret

È importante non dimenticare di assumere la dose di medicamento prevista. Se ha dimenticato di assumere una dose, cerchi di calcolare quanto tempo è trascorso da quando avrebbe dovuto assumere Maviret:

- se si accorge della dimenticanza **entro 18 ore** dall'ora in cui di solito assume Maviret, prenda la dose dimenticata il più presto possibile. Prenda poi la dose successiva alla solita ora.
- se si accorge della dimenticanza solo **18 ore o più** dall'ora in cui di solito assume Maviret, aspetti e prenda la dose successiva al solito orario. Non assuma una dose doppia (due dosi ravvicinate).

Se ha altre domande riguardo all'uso di questo medicamento, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Bambini

Questo medicamento non deve essere utilizzato nei bambini sotto i 12 anni di età. L'uso di Maviret nei bambini sotto i 12 anni di età non è stato esaminato.



Quali effetti collaterali può avere Maviret?

Come tutti i medicinali, anche questo può avere effetti collaterali, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

- stanchezza eccessiva (fatigue)
- mal di testa

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

- capogiri
- sensazione di debolezza
- malessere (nausea)
- diarrea
- prurito
- disturbi del sonno

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola (angioedema)

Singoli casi

È stata riportata la riattivazione di una precedente infezione da epatite B (infezione del fegato). Si sono anche manifestati casi isolati di riduzione dell'appetito, problemi di digestione, stitichezza, dolori addominali, gonfiore addominale e dolori articolari.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Il termine di consumo si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Non conservare a temperature superiori a 30°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Maviret?

Principi attivi

Glecaprevir e pibrentasvir

Una compressa rivestita con film (rosa, ovale, biconvessa, con iscrizione «NXT» su un lato) contiene 100 mg di glecaprevir e 40 mg di pibrentasvir.

Sostanze ausiliarie

Nucleo della compressa: Copovidone K28, tocofersolan, silice colloidale anidra, monocalitato di propilenglicole, croscarmellosa sodica, sodio stearilfumarato



Film di rivestimento della compressa: Ipromellosa 2910, lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, ossido di ferro rosso (E172).

Numero dell'omologazione

66472 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Maviret? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 84 compresse rivestite con film.

Le compresse di Maviret sono confezionate in blister giornalieri da 3 compresse ciascuno. Maviret è disponibile anche in confezione mensile da 84 compresse. La confezione mensile contiene 4 scatole settimanali, ciascuna con 21 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

AbbVie AG, 6330 Cham

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

