

Che cos'è Tenderdol e quando si usa?

Tenderdol è un gel disinfettante, contro i dolori e le infiammazioni della bocca e delle labbra. L'azione di Tenderdol è dovuta alla combinazione dei seguenti principi attivi: salicilato di colina, che svolge un'azione antalgica e antinfiammatoria; cloruro di cetil dimetilbenzilammonio, che esercita un'azione antibatterica ed antimicotica. Levomenolo, componente attivo della camomilla, che possiede proprietà curative, antinfiammatorie e antibatteriche. La sua azione si manifesta il più sovente entro 5 minuti e si mantiene per 2–3 ore. Il gel, di gradevole sapore, ed è indicato anche per i bambini piccoli.

Tenderdol gel è indicato in caso di:

- irritazioni, infiammazioni, lesioni e dolori nella zona delle mucose orali e delle labbra
- e su prescrizione del medico nei disturbi della dentizione dei lattanti e dei bambini
- Tenderdol può essere usato nei bambini e adolescenti con febbre dovuta a influenza, varicella o altre malattie virali solo su prescrizione del medico e solo come medicamento di seconda scelta (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Tenderdol?»)
- dolori, punti dolenti in seguito a pressione e infiammazioni dovuti a protesi dentarie o ad apparecchi di correzione.

Quando non si può usare Tenderdol?

Tenderdol non deve essere usato in caso d'ipersensibilità nota nei confronti di una o più dei principi attivi o dei salicilati (p.es. Aspirina®).

Quando è richiesto prudenza nell'uso di Tenderdol?

I bambini e gli adolescenti con febbre e che soffrono di influenza, varicella o altre malattie virali devono usare Tenderdol solo su prescrizione del medico e solo come medicamento di seconda scelta. Se durante queste malattie o dopo la loro remissione dovessero insorgere disturbi della coscienza seguiti da forte vomito, si raccomanda di consultare immediatamente il medico.

Una dose per adulti di questo medicamento contiene 55 mg di alcol (etanolo), pari a 34.5%.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, è allergico, assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Tenderdol durante la gravidanza o l'allattamento?

Non utilizzare Tenderdol gel durante la gravidanza o l'allattamento senza l'avviso del medico.

Come usare Tenderdol?

Applicare ½–1 cm del gel sulla zona dolente. Se necessario si potrà ripetere l'applicazione ogni 2–3 ore. Per i lattanti e i bambini piccoli utilizzare la metà della dose e per al massimo 4 volte al giorno. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Tenderdol?

Gli effetti collaterali seguenti possono manifestarsi:

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

- Reazioni d'ipersensibilità a causa della presenza di salicilato.

Frequenza non nota

Per via della base idroalcolica, il gel può provocare una lieve sensazione di bruciore sulla pelle lesa.



Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori dalla portata dei bambini!

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Tenderdol?

Il gel Tenderdol protegge i denti.

1 g di gel per la zona orale contiene:

Principi attivi

Salicilato di colina 87.4 mg, cloruro di cetil dimetilbenzilammonio 0.1 mg, levomenolo 4.0 mg.

Sostanze ausiliarie

Etanolo (tenore alcolico 34,5% in ragione della base idroalcolica del gel), glicerolo, ipromellosa, aromi (olio essenziale di badiana e di frutto di finocchio amaro), ciclamato di sodio, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

49153 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Tenderdol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medico.

Tubetto da 20 g.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

