

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Sanukehl Prot D6, Tropfen zum Einnehmen und Einreiben

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Sanukehl Prot D6 angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Sanukehl Prot D6 auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei Pyelonephritis und Pyelitis angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Sanukehl Prot D6 gleichzeitig angewendet werden darf.

Wann darf Sanukehl Prot D6 nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen / angewendet werden?

Sanukehl Prot D6 darf nicht angewendet werden bei

- Bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Proteus-Arten
- Autoimmunerkrankungen
- Kinder unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

Zur Anwendung von Sanukehl Prot D6 bei Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen.

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl Prot D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Sanukehl Prot D6 während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Sanukehl Prot D6 darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wie verwenden Sie Sanukehl Prot D6?

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.



Dosierung für Erwachsene / Anwendung bei Erwachsenen: Zum Einnehmen: bei akuten Zuständen 5–10 Tropfen alle 12–24 Stunden vor einer Mahlzeit; bei chronischen Verlaufsformen 10 Tropfen alle 48 Stunden vor einer Mahlzeit.

Zum Einreiben: alle 1–2 Tage 5–10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeuge. Die Anwendung und Sicherheit von Sanukehl Prot D6 bei Kindern und Jugendlichen wurde bisher nicht geprüft. Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen. Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

Welche Nebenwirkungen kann Sanukehl Prot D6 haben?

Bei Einnahme / Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Sanukehl Prot D6 ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihre Ärztin, Apothekerin.

Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl Prot D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Proteus vulgaris* ausgelöst werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Ihre Ärztin, Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "Verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Das Arzneimittel ist nach Anbruch innerhalb von 60 Tagen aufzubrauchen.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

Was ist in Sanukehl Prot D6 enthalten?

1 ml Flüssigkeit (22 Tropfen) enthält:

Wirkstoffe

Proteus vulgaris extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5a) 1 ml

Hilfsstoffe

Gereinigtes Wasser

Zulassungsnummer

53406 (Swissmedic)



Wo erhalten Sie Sanukehl Prot D6? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packung zu 10 ml.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

HerstellerIn

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Diese Packungsbeilage wurde im Januar 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

