

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sanukehl Prot D6, gocce da ingerire e da frizionare

Medicamento omeopatico

Quando si usa Sanukehl Prot D6?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Sanukehl Prot D6 può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di pielonefrite e pielite.

L'uso di questo medicamento nel settore d'applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere/usare Sanukehl Prot D6.

Quando non si può assumere/usare Sanukehl Prot D6 e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Sanukehl Prot D6 non deve essere utilizzato in caso di

- Ipersensibilità nota alle specie di *Proteus*
- Malattie autoimmuni
- Bambini sotto i 12 anni
- Donne incinte e che allattano

Non vi è esperienza adeguatamente documentata sull'uso di Sanukehl Prot D6 negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Pertanto, il suo uso per bambini e adolescenti sotto i 18 anni non è raccomandato.

Farmaci o terapie immunosoppressive possono compromettere l'efficacia di Sanukehl Prot D6. È necessario mantenere un intervallo di 4 settimane prima e dopo il trattamento con vaccini vivi somministrati per via orale.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere/usare Sanukehl Prot D6 durante la gravidanza o l'allattamento?

Sanukehl Prot D6 non deve essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Sanukehl Prot D6?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Posologia negli adulti/Usi per adulti: Da prendere: in casi acuti 5–10 gocce ogni 12–24 ore prima di un pasto, in casi cronici 10 gocce ogni 48 ore prima di un pasto.

Da frizionare: 5–10 gocce ogni 1–2 giorni sulla parte colpita o al di sopra del gomito. L'uso e la sicurezza di Sanukehl Prot D6 nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono stati testati.

Pertanto non è raccomandato l'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Non utilizzare su bambini di età inferiore a 12 anni.

Quali effetti collaterali può avere Sanukehl Prot D6?

Con l'assunzione/l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Sanukehl Prot D6 e informi il suo medico o il suo farmacista.

A causa del contenuto di componenti organici specifici in Sanukehl Prot D6, in rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità, principalmente sotto forma di reazioni cutanee e possono causare un'allergia contro il componente *Proteus vulgaris*.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Il medicinale deve essere utilizzato entro 60 giorni dall'apertura.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sanukehl Prot D6?

1 ml di liquido (22 gocce) contiene:

Principi attivi

Proteus vulgaris extractum cellulae (lyophil., steril.) D6 (HAB 5a) 1 ml

Sostanze ausiliarie

acqua purificata

Numero dell'omologazione

53406 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Sanukehl Prot D6? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.



Confezione da 10 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

