

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

co-HYPERT, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa co-HYPERT?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della Spagirica, co-HYPERT può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di una leggera ipertensione sanguigna. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere co-HYPERT. La pressione sanguigna deve regolarmente essere controllata.

Quando non si può assumere co-HYPERT e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Il prodotto non è adatto per bambini e adolescenti fino a 18 anni di età.

Non deve essere assunto durante la gravidanza o l'allattamento.

Questo medicamento contiene 90 mg di alcol (etanolo) in 20 gocce corrispondere 192 mg/ml (19,2% w/v).

La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere co-HYPERT durante la gravidanza o l'allattamento?

co-HYPERT non deve essere utilizzate durante la gravidanza o nel periodo di allattamento.

Come usare co-HYPERT?

Salvo diversa prescrizione medica: adulti 2 volte al giorno 20 gocce con un po' d'acqua prima dei pasti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere co-HYPERT?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con co-HYPERT e informi il suo medico o il suo farmacista.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di co-HYPERT.



Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene co-HYPERT?

1 g di liquido (= 1,03 ml / 43 gocce) contiene:

Principi attivi

Anamirta cocculus (HAB) D4 (Ph.Eur.Hom. 1.1.8) 145 mg

Barium carbonicum (HAB) D12 85 mg

Iberis amara (HAB) D6 125 mg

Magnesium chloratum (HAB) D8 (HAB 5a) 105 mg

Melilotus officinalis ex herba cum floribus spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Natrium tetrachloroauratum (HAB) D4 (Ph.Eur.Hom. 3.1.1) 145 mg

Sumbulus moschatus e radice D6 (HAB 4a) 125 mg

Viscum album ex herba cum fructibus spag. Peka D6 (HAB 47a) 125 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata.

Contiene 24 % vol. di alcol

Numero dell'omologazione

55061 (Swissmedic)

Dove è ottenibile co-HYPERT? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 100 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

