

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Féلودіріне Sandoz® eco

Sandoz Pharmaceuticals AG

Qu'est-ce que Féلودіріне Sandoz eco et quand doit-il être utilisé?

Sur prescription du médecin et sous son contrôle médical permanent.

Féلودіріне Sandoz eco contient le principe actif féلودіріне. Il sert au traitement de toutes les formes d'augmentation de pression sanguine (hypertension) ainsi que de l'angine de poitrine (douleurs oppressives d'origine cardiaque). La féلودіріне fait partie du groupe des antagonistes du calcium, qui ont une influence sur les processus métaboliques au niveau des fibres musculaires cardiaques et vasculaires. La pression sanguine trop élevée est ramenée à un niveau normal sous l'effet de la relaxation de la musculature vasculaire et de la dilatation des artères.

Quand Féلودіріне Sandoz eco ne doit-il pas être pris?

Féلودіріне Sandoz eco ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif féلودіріне ou à l'un des excipients.

Féلودіріне Sandoz eco ne doit pas être pris:

- si vous avez subi un accident vasculaire cérébral (AVC) au cours des six derniers mois,
- si vous souffrez d'un choc cardio-vasculaire,
- si vos valves cardiaques sont rétrécies, entravant ainsi le débit sanguin,
- si vous souffrez d'une maladie du cœur qui réduit la capacité des cavités cardiaques,
- si vous ressentez des douleurs au niveau de la poitrine au repos ou au moindre effort (angine de poitrine instable),
- si vous avez subi un infarctus au cours des 8 dernières semaines,
- si vous présentez des troubles de la transmission de l'influx nerveux entre les oreillettes et les ventricules cardiaques,
- si vous avez une fonction hépatique fortement restreinte,
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque non stabilisée par des mesures médicales,
- si vous prenez certains médicaments contre les mycoses (par ex. itraconazole).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Féلودіріне Sandoz eco?

L'effet antihypertenseur de Féلودіріне Sandoz eco peut être potentialisé par d'autres médicaments hypotenseurs.

Toute une série d'autres médicaments pris en même temps que Féلودіріне Sandoz eco peuvent avoir une influence sur son effet antihypertenseur. En font partie par exemple certains médicaments destinés au traitement de l'hypersécrétion acide dans l'estomac, des infections bactériennes ou virales, des mycoses, des dépressions (aussi millepertuis p.ex.) et de l'épilepsie.

Comme d'autres vasodilatateurs, Féلودіріне Sandoz eco peut provoquer une chute de la pression artérielle avec des palpitations (pouls accéléré). Ceci pouvant entraîner une diminution de l'irrigation sanguine du muscle cardiaque chez certains patients, veuillez demander à votre médecin si vous présentez à cet égard un risque particulier.



Féلودipine Sandoz eco doit être utilisé avec prudence si vous avez tendance à avoir un pouls élevé.

La prise de Féلودipine Sandoz eco nécessite une prudence particulière si votre fonction rénale est fortement limitée. La féلودipine étant métabolisée dans le foie, la prudence est également de mise en cas d'insuffisance hépatique.

Ne pas prendre Féلودipine Sandoz eco avec du jus de pamplemousse, ceci pouvant entraîner un effet plus marqué du médicament.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines. Ceci est surtout le cas en début de traitement, de même qu'en association à l'alcool.

Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé retard, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Lactose

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- si vous êtes allergique ou
- si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Féلودipine Sandoz eco peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Veuillez parler à votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse. Féلودipine Sandoz eco ne doit pas être pris pendant la grossesse.

Le principe actif diffuse dans le lait maternel. Votre médecin doit décider de l'opportunité de l'administration du médicament en période d'allaitement.

Comment utiliser Féلودipine Sandoz eco?

Le médecin fixera la dose qui vous convient sur la base de contrôles réguliers de votre tension artérielle.

L'hypertension ainsi que l'angine de poitrine doivent être traitées à long terme et nécessitent donc des contrôles réguliers chez votre médecin.

Il faut habituellement prendre 1 comprimé retard de Féلودipine Sandoz eco à 5 mg ou 10 mg le matin, avec le petit-déjeuner.

Comme les comprimés retard de Féلودipine Sandoz eco ne peuvent pas être partagés, votre médecin peut également vous prescrire les comprimés retard de Féلودipine Sandoz eco à 2,5 mg pour adapter la dose de manière optimale.

Avalez le comprimé retard sans le croquer avec suffisamment de liquide. Vous ne devez pas le partager, mais l'avaler en entier. Les comprimés retard peuvent être pris à jeun ou après un petit-déjeuner léger, pauvre en lipides et en hydrates de carbone.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Féلودipine Sandoz eco n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Féلودipine Sandoz eco peut-il provoquer?

La prise de Féلودipine Sandoz eco peut provoquer les effets secondaires suivants, surtout au début du traitement ou après une augmentation de la dose. La plupart du temps, ces effets indésirables sont passagers et s'atténuent lors de la poursuite du traitement.



Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Maux de tête, accumulation de liquide dans les tissus, gonflement des chevilles.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Vertiges, fatigue, pouls rapide, pouls très lent, pression trop basse, palpitations, nausées, maux de ventre, rougeur du visage, démangeaisons.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Battements cardiaques irréguliers, vomissements, urticaire, douleurs musculaires et articulaires, tremblements musculaires, impuissance et troubles sexuels.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Réactions d'hypersensibilité, gonflement soudain de la peau/des muqueuses (souvent au visage), sensibilité accrue de la peau à la lumière, agitation, infarctus du myocarde, troubles respiratoires, diarrhée, constipation, mictions fréquentes avec élimination de petites quantités d'urine, desquamations étendues (peau qui pèle), grossissement des glandes mammaires chez l'homme, menstruations prolongées/fortes, prise de poids, sueurs.

Chez certains patients dont les gencives sont très enflammées, il peut se produire des altérations gingivales qui peuvent être prévenues par une hygiène dentaire soigneuse ou régresser spontanément.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver dans l'emballage original, à température ambiante (15–25°C) et hors de la portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Félodipine Sandoz eco?

1 comprimé retard de Félodipine Sandoz eco contient

Principes actifs

2,5 mg, 5 mg respectivement 10 mg de félodipine.

Excipients

Félodipine Sandoz eco 2,5 mg:

Lactose monohydraté, laurilsulfate de sodium, cellulose microcristalline, hypromellose, stéarate de magnésium.

Le noyau du comprimé est également recouvert d'une pellicule composée de lactose monohydraté, hypromellose, macrogol 4000, dioxyde de titane (E171) et oxyde de fer jaune (E172).



Féلودipine Sandoz eco 5 mg et 10 mg:

Lactose monohydraté, laurilsulfate de sodium, cellulose microcristalline, hypromellose, stéarate de magnésium.

Le noyau du comprimé est également recouvert d'une pellicule composée de lactose monohydraté, hypromellose, macrogol 4000, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172) et oxyde de fer rouge (E172).

Numéro d'autorisation

56170 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Féلودipine Sandoz eco? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Les emballages suivants sont disponibles:

Féلودipine Sandoz eco 2,5 mg: en emballages de 30 comprimés retard.

Féلودipine Sandoz eco 5 mg: en emballages de 20 et 100 comprimés retard.

Féلودipine Sandoz eco 10 mg: en emballages de 20 et 100 comprimés retard.

Titulaire de l'autorisation

Sandoz Pharmaceuticals SA, Risch; domicile: Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

