

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fé lodipine Sandoz[®] eco

Sandoz Pharmaceuticals AG

Che cos'è Fé lodipine Sandoz eco e quando si usa?

Su prescrizione medica e sotto costante controllo del medico.

Fé lodipine Sandoz eco contiene come sostanza attiva la felodipina e serve al trattamento di tutte le forme di pressione elevata (ipertensione) come anche dell'angina pectoris (oppressione cardiaca). La felodipina appartiene al gruppo degli antagonisti del calcio, sostanze che influenzano l'andamento metabolico nel cuore e nelle cellule muscolari dei vasi sanguigni. La pressione elevata viene ricondotta ad un livello normale sia attraverso il rilassamento della muscolatura dei vasi che tramite l'allargamento delle arterie.

Quando non si può assumere Fé lodipine Sandoz eco?

Fé lodipine Sandoz eco non può essere usato in caso di ipersensibilità conosciuta al principio attivo felodipina o a una delle sostanze ausiliarie.

Fé lodipine Sandoz eco non deve essere assunto:

- se ha avuto un ictus nel corso degli ultimi sei mesi,
- se ha uno shock cardiocircolatorio,
- se il flusso di sangue è ostacolato da un restringimento delle valvole cardiache,
- se soffre di una malattia del muscolo cardiaco che causa il restringimento della cavità del cuore,
- se accusa dolori al torace sia a riposo che in caso di lieve sforzo (angina pectoris instabile),
- se ha avuto un infarto cardiaco nelle ultime otto settimane,
- se nel cuore è presente un disturbo nella conduzione dell'eccitazione dagli atri ai ventricoli,
- se la funzionalità epatica è gravemente compromessa,
- se soffre di insufficienza cardiaca non stabilizzata da misure mediche,
- se usa determinati medicinali contro le infezioni da funghi (p.es. itraconazolo).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Fé lodipine Sandoz eco?

L'effetto ipotensivo di Fé lodipine Sandoz eco può essere potenziato da altri medicinali che abbassano la pressione del sangue.

Una serie di altri medicinali potrebbero influenzare l'effetto ipotensivo di Fé lodipine Sandoz eco se presi contemporaneamente. Vi appartengono per esempio determinati medicinali per il trattamento dell'iperacidità gastrica, infezioni batteriche o virali, micosi, depressioni (ad es. anche l'iperico) e epilessia.

Come altri medicinali vasodilatatori, Fé lodipine Sandoz eco può causare ipotensione con tachicardia (battito cardiaco accelerato). Poiché in alcuni pazienti ciò può condurre a una riduzione del flusso di sangue al muscolo cardiaco, si rivolga al medico per verificare se vi è un rischio elevato.

L'assunzione di Fé lodipine Sandoz eco richiede prudenza se vi è predisposizione a una frequenza cardiaca accelerata.

L'uso di Fé lodipine Sandoz eco richiede particolare prudenza nel caso in cui la funzionalità renale sia gravemente compromessa. Poiché la felodipina è metabolizzata nel fegato, si raccomanda prudenza anche in caso di insufficienza epatica.



Fé lodipine Sandoz eco non deve essere assunto insieme a succo di pompelmo, poiché questo può potenziarne l'efficacia.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine. Questo è valido in particolare all'inizio del trattamento e in caso di consumo di alcool.

Sodio

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa ad effetto prolungato, cioè essenzialmente «senza sodio».

Lattosio

Questo medicamento contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Fé lodipine Sandoz eco durante la gravidanza o l'allattamento?

Informi il suo medico se è incinta oppure se ha pianificato una gravidanza. Fé lodipine Sandoz eco non può essere assunto durante la gravidanza. Il principio attivo passa nel latte materno. Il medico decide sull'opportunità dell'uso durante l'allattamento.

Come usare Fé lodipine Sandoz eco?

Il medico potrà stabilire il dosaggio adeguato alla situazione individuale tramite regolari controlli della pressione.

L'ipertensione come anche l'angina pectoris devono essere trattate per lunghi periodi di tempo e quindi devono essere regolarmente controllate dal medico.

Normalmente la dose è di una compressa ad effetto prolungato di Fé lodipine Sandoz eco 5 mg rispettivamente 10 mg da prendere la mattina a colazione.

Siccome le compresse ad effetto prolungato di Fé lodipine Sandoz eco non possono essere divise, per un adeguamento del dosaggio il medico potrebbe prescrivere le compresse ad effetto prolungato di Fé lodipine Sandoz eco da 2,5 mg.

Le compresse ad effetto prolungato non vanno masticate e non si devono dividere in due. Si prendono tutte intere con una sufficiente quantità di liquido. Le compresse ad effetto prolungato possono essere assunte a digiuno oppure dopo una leggera colazione povera di grassi e carboidrati. L'uso e la sicurezza di Fé lodipine Sandoz eco nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fé lodipine Sandoz eco?

Con l'assunzione di Fé lodipine Sandoz eco possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali, soprattutto all'inizio del trattamento oppure dopo un aumento della dose. Si tratta per lo più di disturbi passeggeri che si affievoliscono con il procedere della terapia.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Mal di testa, ritenzione di liquidi nei tessuti, gonfiore alle caviglie.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)



Vertigini, stanchezza, aumento della frequenza cardiaca, forte rallentamento della frequenza cardiaca, forte ipotensione, palpitazioni, nausea, dolore addominale, rossore al viso, prurito.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Battito cardiaco irregolare, vomito, orticaria, dolori muscolari e articolari, tremori muscolari, impotenza e disfunzione sessuale.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Reazioni di ipersensibilità, improvviso gonfiore della pelle/delle mucose, spesso al viso, aumentata sensibilità cutanea alla luce, irrequietezza, infarto cardiaco, problemi respiratori, diarrea, stitichezza, frequente emissione di piccole quantità di urina, desquamazione cutanea su ampie zone, ingrossamento della ghiandola mammaria nell'uomo, mestruazioni prolungate/intense, aumento di peso, sudorazione.

In pazienti con marcate infiammazioni alle gengive si potrebbero verificare modificazioni alle gengive che però possono essere evitate o fatte regredire con una accurata igiene dentaria.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15–25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Féلودipine Sandoz eco?

1 compressa ad effetto prolungato di Féلودipine Sandoz eco contiene

Principi attivi

2,5 mg, 5 mg rispettivamente 10 mg di felodipina.

Sostanze ausiliarie

Féلودipine Sandoz eco 2,5 mg:

Lattosio monoidrato, sodio lauril solfato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, magnesio stearato.

Il nucleo della compressa è inoltre rivestito da un film di lattosio monoidrato, ipromellosa, macrogol 4000, titanio diossido (E171) e ossido di ferro giallo (E172).

Féلودipine Sandoz eco 5 mg e 10 mg:

Lattosio monoidrato, sodio lauril solfato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, magnesio stearato.

Il nucleo della compressa è inoltre rivestito da un film di lattosio monoidrato, ipromellosa, macrogol 4000, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172).

Numero dell'omologazione



56170 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Félodipine Sandoz eco? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Le seguenti confezioni sono disponibili:

Félodipine Sandoz eco 2,5 mg: confezioni da 30 compresse ad effetto prolungato.

Félodipine Sandoz eco 5 mg: confezioni da 20 e 100 compresse ad effetto prolungato.

Félodipine Sandoz eco 10 mg: confezioni da 20 e 100 compresse ad effetto prolungato.

Titolare dell'omologazione

Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

