

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Similasan Troubles circulatoires, globules

Médicament homéopathique

Quand Similasan Troubles circulatoires est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Similasan Troubles circulatoires peut être utilisé en cas de faiblesse, abattement, hébétéude, vertiges, bourdonnement d'oreille, congestion céphalique, palpitations d'origine nerveuse, troubles du rythme cardiaque, pouls irrégulier et Bouffées de chaleur, frissons (également froid aux extrémités)

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si votre pouls devient soudain irrégulier, en cas de fortes palpitations, de douleurs lancinantes dans la région de la poitrine ou de sensation d'étouffement ou si ces troubles persistent, il est conseillé de consulter un médecin. Il saura constater si le coeur ou les vaisseaux sont affectés d'une maladie organique ou si les troubles sont d'origine nerveuse.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Similasan Troubles circulatoires peut être pris simultanément.

Quand Similasan Troubles circulatoires ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Similasan Troubles circulatoires ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

Similasan Troubles circulatoires peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.



Comment utiliser Similasan Troubles circulatoires?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adolescents à partir de 12 ans et adultes: 7 globules par prise.

- **Troubles aigus:** Toutes les heures. Lorsque l'amélioration est sensible, diminuer les doses en fonction des besoins.
- **Lors de troubles chroniques:** 3 fois par jour. Si ces globules sont appelés à être pris pendant un certain temps, informez-en votre médecin.

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Ne pas administrer chez les enfants de moins de 12 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, l'administration du médicament doit être répétée lorsque l'effet diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Similasan Troubles circulatoires peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Similasan Troubles circulatoires et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Similasan Troubles circulatoires n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Similasan Troubles circulatoires?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Arnica montana (HAB) D6 2.500 mg / Camphora (HAB) D10 2.500 mg / Naja naja (HAB) D10 2.500 mg / Viscum album (HAB) D6 2.500 mg

Excipients



Carbonate de calcium, Xylite (E 967)

1 g correspond à 70-90 globules

Numéro d'autorisation

53243 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Similasan Troubles circulatoires? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

