

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Similasan Disturbi della circolazione, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa Similasan Disturbi della circolazione?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Similasan Disturbi della circolazione può essere usato in caso di debolezza, spossatezza, stordimento, vertigini, ronzio auricolare, congestione al capo, palpitazioni nervose, agitazione cardiaca, polso irregolare, vampare di calore o sensazione di freddo (specie alle mani e ai piedi).

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Si raccomanda di consultare un medico se dovessero comparire improvvisamente o persistere a lungo polso irregolare, forti palpitazioni, dolori lancinanti nella regione cardiaca e dispnea. Il medico stabilirà l'eventuale presenza di una malattia organica a carico del cuore o dei vasi oppure se si tratta di disturbi di origine nervosa.
- Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Similasan Disturbi della circolazione.

Quando non si può assumere Similasan Disturbi della circolazione e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Similasan Disturbi della circolazione non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Finora non sono note limitazioni d'uso. Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere Similasan Disturbi della circolazione durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Similasan Disturbi della circolazione?



Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti dai 12 anni e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** Ogni ora. In caso di evidente miglioramento, ridurre a piacere la frequenza.
- **Disturbi cronici:** 3 volte al giorno. L'uso prolungato del medicamento andrebbe discusso con il medico.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni.

La durata dell'effetto di una somministrazione può variare da persona a persona. In linea di principio, in caso di diminuzione dell'effetto o di ricomparsa dei disturbi, ripetere l'assunzione del preparato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Similasan Disturbi della circolazione?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Similasan Disturbi della circolazione e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Similasan Disturbi della circolazione. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Similasan Disturbi della circolazione?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D6 2.500 mg / Camphora (HAB) D10 2.500 mg / Naja naja (HAB) D10 2.500 mg /
Viscum album (HAB) D6 2.500 mg

Sostanze ausiliarie

Carbonato di calcio, xilitolo (E 967)

1 g di globuli equivale a 70-90 globuli



Numero dell'omologazione

53243 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Similasan Disturbi della circolazione? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

