

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è Perenterol travel e quando si usa?

Perenterol travel è un medicamento contro la diarrea e contiene come principio attivo un lievito (*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745). È usato nella terapia della diarrea del viaggiatore. Permette di ristabilire la flora intestinale e di alleviare la diarrea.

Perenterol travel regola e normalizza l'attività intestinale.

Il lievito *Saccharomyces boulardii* è resistente agli antibiotici e agisce all'interno dell'intestino in forma vivente. Non è assorbito dall'organismo.

In diversi studi è stato osservato un effetto inibitorio sullo sviluppo di diversi batteri patogeni e su *Candida albicans*.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di diarrea, il paziente (in particolare bambini e persone anziane) deve assumere liquidi a sufficienza. Si dovrà consultare un medico nel caso in cui i sintomi dovessero persistere oltre i 2-3 giorni. Nei lattanti, una diarrea può essere pericolosa dopo breve tempo, cioè già dopo un giorno, a causa della perdita d'acqua e d'elettroliti. È pertanto consigliato consultare il proprio medico per tempo.

Quando non si può assumere Perenterol travel e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso d'ipersensibilità ad uno dei componenti. Allergia al lievito, in particolare a *Saccharomyces boulardii*.

Perenterol travel non dev'essere usato nei pazienti affetti da un'immunodeficienza severa (per es. infezione da HIV, trapianto di organi, leucemia, tumori maligni in fase avanzata, radioterapia, chemioterapia, trattamento con cortisone a lungo termine a dosi elevate).

I pazienti con un catetere venoso centrale (per es. port-a-cath) non devono usare Perenterol travel a causa del rischio d'infezione da *Saccharomyces boulardii*.

Perenterol travel è costituito da cellule viventi, quindi il medicamento non dev'essere mischiato con liquidi o alimenti troppo caldi (più di 50 °C), ghiacciati o contenenti alcool.

Inoltre, i lieviti contenuti in Perenterol travel sono sensibili ai medicinali che inibiscono la crescita di funghi (antimicotici). Nel caso in cui il suo medico le abbia prescritto questo tipo di medicinali, dovrà rinunciare all'uso di Perenterol travel, poiché questi medicinali distruggono il suo principio attivo.

Lattosio: se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Perenterol travel.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Perenterol travel durante la gravidanza o l'allattamento?

Non esiste nessuna obiezione all'uso di Perenterol travel durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Perenterol travel?

Il medicamento si assume per via orale.

Trattamento d'attacco: il primo giorno assumere 2 capsule (1 il mattino e 1 la sera).



Trattamento di mantenimento: i giorni seguenti assumere 1 capsula al giorno fino alla scomparsa dei sintomi.

Su consiglio del medico, il trattamento d'attacco (2 capsule al giorno) può essere proseguito in caso di bisogno per più giorni o essere aumentato.

In caso di vomito a meno di un'ora dall'assunzione del medicamento, l'assunzione dovrà essere ripetuta.

Perenterol travel può essere somministrato a lattanti, bambini ed adulti con la stessa posologia.

Modo d'uso

Ingerire la capsula con un po' di liquido.

Per i lattanti: versare il contenuto di una capsula nella pappa o nel biberon. Fare attenzione che la temperatura del cibo non sia troppo elevata (non deve superare i 50 °C).

Perenterol travel può essere preso in ogni momento della giornata. Per ottenere un'azione più rapida, assumere il medicamento prima dei pasti.

Perenterol travel può anche essere assunto con un antibiotico, indipendentemente dall'ora della somministrazione di questo, però non con un antimicotico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Perenterol travel?

In casi molto rari sono state osservate delle penetrazioni di lieviti nel sangue (fungemia) e in casi isolati gravi infezioni del sangue (sepsi) in pazienti in condizioni critiche o immunocompromessi o portatori d'un catetere venoso centrale; questi casi possono essere accompagnati anche da febbre.

Perenterol travel può raramente provocare gonfiore intestinale e in casi molto rari stitichezza.

Molto raramente possono comparire reazioni cutanee allergiche come prurito, eruzioni cutanee o orticaria, respirazione difficoltosa, reazioni anafilattiche e shock anafilattico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a 15-30 °C e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Perenterol travel?

Principi attivi

1 capsula contiene: 250 mg di *Saccharomyces boulardii* (*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745) liofilizzato, corrispondente ad almeno 2 miliardi di cellule viventi.

Sostanze ausiliarie

1 capsula contiene: 32,5 mg di lattosio monoidrato, stearato di magnesio. Involucro della capsula: gelatina, diossido di titanio (E171).

Numero dell'omologazione



60114 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Perenterol travel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 8 e 12 *capsule*.

Titolare dell'omologazione

Zambon Svizzera SA, 6814 Cadempino

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

