

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Kadefemin® Micostop**

**Max Zeller Söhne AG**

### ***Che cos'è Kadefemin Micostop e quando si usa?***

Kadefemin Micostop contiene compresse vaginali e una crema a base del principio attivo clotrimazolo ed è un medicamento contro le infezioni fungine (micosi). Kadefemin Micostop è usato in caso di infezioni della vagina e della zona genitale esterna causate da funghi (si solito Candida).

La Candida è un fungo che si può riscontrare sulla pelle e, in moltissime donne, anche nella vagina. Solo in caso di proliferazione eccessiva si sviluppa una malattia fungina (micosi) che in genere si manifesta con rossore, bruciore, prurito, secrezioni e infiammazioni dolorose. Una diagnosi sicura può essere effettuata solo dal proprio medico.

### ***Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?***

Durante il trattamento, deodoranti o prodotti per l'igiene intima devono essere utilizzati solo dopo aver consultato il proprio medico, poiché potrebbero ridurre l'efficacia di Kadefemin Micostop.

Se Kadefemin Micostop è usato insieme a prodotti in lattice come preservativi o diaframmi, le sostanze ausiliarie contenute possono ridurre la resistenza allo strappo di tali prodotti e quindi comprometterne la sicurezza. Questo effetto è temporaneo e limitato al periodo di trattamento.

Durante l'uso di Kadefemin Micostop, si raccomanda di evitare i rapporti sessuali, poiché l'infezione può essere trasmessa al partner. Per evitare una possibile reinfezione, è consigliabile che anche il partner si sottoponga a un esame medico.

In caso di un'infiammazione del glande e del prepuzio del partner dovuta a un'infezione fungina diagnosticata dal medico, è necessario effettuare un trattamento topico supplementare con le forme di applicazione previste.

### ***Quando non si può usare Kadefemin Micostop?***

Kadefemin Micostop non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità al clotrimazolo o ad una delle sostanze ausiliarie (vedere «Cosa contiene Kadefemin Micostop?»).

### ***Quando è richiesta prudenza nell'uso di Kadefemin Micostop?***

Alcuni dei componenti contenuti nelle compresse vaginali e nella crema possono provocare irritazioni cutanee locali (ad esempio dermatiti da contatto). In caso di irritazione locale o reazione allergica, il trattamento con Kadefemin Micostop deve essere interrotto.

Evitare il contatto con gli occhi.

Kadefemin Micostop deve essere usato solo con particolare prudenza durante la gravidanza (vedere «Gravidanza, allattamento»).

In caso di assunzione contemporanea di tacrolimus, è necessario chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzare Kadefemin Micostop, poiché un eventuale sovradosaggio di tacrolimus deve essere attentamente monitorato.

In condizioni di laboratorio (sperimentali e microbiologiche), il principio attivo di Kadefemin Micostop può ridurre l'efficacia di altre sostanze che agiscono localmente contro i saccaromiceti (come l'amfotericina B, la nistatina o la natamicina).



Se Kadefemin Micostop viene assunto in quantità considerevoli, ad esempio dai bambini, non sono previsti gravi sintomi di intossicazione. Tuttavia, possono verificarsi disturbi come dolori addominali e nausea. Per sicurezza, si raccomanda comunque di informarne il medico.

Questo medicamento contiene 10 mg di alcol benzilico e 100 mg di alcol cetostearilico per 1 g di crema. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche e lievi irritazioni locali. L'alcol cetostearilico può provocare irritazioni cutanee locali (ad esempio dermatiti da contatto).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

### ***Si può usare Kadefemin Micostop durante la gravidanza o l'allattamento?***

#### ***Gravidanza***

Per ragioni di cautela, durante la gravidanza si dovrebbe usare Kadefemin Micostop solo dopo un'adeguata valutazione di rischi e benefici da parte del medico curante. Durante la gravidanza, il trattamento con compresse vaginali deve essere effettuato senza applicatore.

#### ***Allattamento al seno***

Durante l'allattamento, si può usare Kadefemin Micostop solo dopo aver consultato il medico.

### ***Come usare Kadefemin Micostop?***

#### ***Dosaggio raccomandato***

In genere, applicare 1 compressa vaginale (200 mg di clotrimazolo) 1 volta al giorno.


La crema viene solitamente applicata 3 volte al giorno. La quantità dipende dalla dimensione delle aree cutanee da trattare.

#### ***Modalità di utilizzo***

Inserire le compresse vaginali la sera prima di coricarsi, utilizzando l'applicatore in dotazione, preferibilmente in posizione supina con le gambe leggermente sollevate.

Applicare un sottile strato di crema con il dito sugli organi genitali esterni fino all'ano.

#### ***Uso dell'applicatore:***

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Se le compresse vaginali vengono usate con l'applicatore, estrarre l'asta fino all'arresto e inserire la compressa vaginale nell'applicatore (1).                                                  |
|  | Inserire l'applicatore con la compressa vaginale il più profondamente possibile in vagina e spingere l'asta fino all'arresto. In tal modo, la compressa vaginale viene collocata nella vagina (2). |
|  | Successivamente, estrarre l'applicatore e pulirlo accuratamente con acqua calda. A tal fine, estrarre completamente l'asta dall'applicatore (3). Una volta asciutto, riassemblare l'applicatore.   |

Il trattamento non deve essere effettuato durante le mestruazioni, ossia dovrebbe essere completato prima dell'inizio delle stesse.

L'applicatore non deve essere usato durante la gravidanza (vedere «Si può usare Kadefemin Micostop durante la gravidanza o l'allattamento?»).



### *Durata di utilizzo*

Un'applicazione di durata sufficientemente lunga è importante per il successo del trattamento.

Generalmente, è sufficiente un'applicazione di 3 giorni consecutivi. Se necessario, tuttavia, su indicazione del medico è possibile effettuare un secondo trattamento successivo per altri 3 giorni. Il medico decide la durata del trattamento, a seconda dell'entità e della localizzazione della malattia.

### *Cosa fare in caso di utilizzo di Kadefemin Micostop in quantità maggiore rispetto a quella prevista*

Se il prodotto è utilizzato conformemente all'uso previsto, non è prevedibile alcun sovradosaggio o intossicazione.

Se durante il trattamento con Kadefemin Micostop dovesse inserire accidentalmente più di 1 compressa vaginale o applicare la crema più frequentemente, non sono prevedibili gravi effetti collaterali (vedere anche «Quali effetti collaterali può avere Kadefemin Micostop?»). In questo caso, riduca l'applicazione alla dose prevista dal suo medico e si attenga al piano di trattamento.

### *Cosa fare se si dimentica di applicare Kadefemin Micostop*

Se dovesse dimenticare di applicare il prodotto, non assuma la doppia quantità all'applicazione successiva.

Se dovesse dimenticare diverse applicazioni, verifichi con il suo medico se sia necessario prolungare il trattamento.

### *Cosa fare se si interrompe l'applicazione di Kadefemin Micostop*

Voglia discutere l'ulteriore procedura con il suo medico, poiché in questo caso il successo del trattamento è a rischio.

Questo medicamento non è destinato all'uso nei bambini e negli adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

### **Quali effetti collaterali può avere Kadefemin Micostop?**

- Irritazioni cutanee locali con rossore temporaneo, prurito, bruciore o dolore pungente.
- Ipersensibilità, reazioni allergiche con sintomi come prurito, arrossamento cutaneo, orticaria, difficoltà respiratorie, calo della pressione sanguigna che richiede un trattamento fino a stati di coscienza alterati. Si rivolga al suo medico per discutere la continuazione del trattamento.
- Dolori addominali, nausea, diarrea.
- Dolori alla parte bassa dell'addome, sanguinamento vaginale.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

#### *Stabilità*

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

#### *Termine di consumo dopo l'apertura*

Dopo l'apertura, utilizzare Kadefemin Micostop crema entro 6 mesi.

#### *Istruzioni di conservazione*

Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### *Ulteriori indicazioni*



Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

### ***Cosa contiene Kadefemin Micostop?***

#### ***Principi attivi***

1 compressa vaginale contiene 200 mg di clotrimazolo. 1 g di crema contiene 20 mg di clotrimazolo.

#### ***Sostanze ausiliarie***

**Compressa vaginale:** lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, acido adipico, bicarbonato di sodio, acido stearico, stearato di magnesio, biossido di silicio altamente disperso, polisorbato 80.

**Crema:** acqua purificata, ottildodecanolo, alcol cetostearilico, cetil palmitato, sorbitano monostearato, polisorbato 60, alcol benzilico.

### ***Numero dell'omologazione***

67736 (Swissmedic)

### ***Dove è ottenibile Kadefemin Micostop? Quali confezioni sono disponibili?***

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione combinata con 20 g di crema e 3 compresse vaginali con applicatore.

### ***Titolare dell'omologazione***

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

