

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Nizoral® Crème

Spirig HealthCare AG

Qu'est-ce que Nizoral Crème et quand doit-il être utilisé?

Nizoral Crème est efficace contre les infections cutanées mycosiques causées par des champignons filamenteux (dermatophytes) et des levures.

Nizoral Crème est utilisé dans le traitement d'affections cutanées superficielles à champignons du tronc, de la région inguinale, des pieds et des mains, ainsi que dans le traitement de l'eczéma séborrhéique.

Nizoral Crème est en outre utilisé dans le traitement de la dermatose squameuse (pityriasis versicolor).

Dès les premiers jours du traitement avec Nizoral Crème, le patient remarque une amélioration due à l'apaisement des démangeaisons qui surviennent souvent avec une infection fongique.

Selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Après avoir utilisé Nizoral Crème, lavez-vous les mains, afin d'éviter la transmission de l'infection sur une autre partie du corps ou à d'autres personnes. Prenez soin d'utiliser un autre linge pour sécher les parties lésées. Des mesures hygiéniques (p.ex. lavage quotidien des zones atteintes, changement fréquent les vêtements en contact avec les zones lésées) sont fortement recommandées.

Quand Nizoral Crème ne doit-il pas être utilisé?

Nizoral Crème ne doit pas être utilisé lors d'allergie connue à l'un des composants du produit ou à un autre dérivé de l'imidazole. Les symptômes suivants peuvent être le signe d'une réaction allergique: démangeaisons, sensations de brûlure et rougeurs survenant après l'application de la crème sur la peau. Si de telles réactions se présentent, cessez l'application de Nizoral Crème et informez-en votre médecin.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Nizoral Crème?

Ne pas appliquer Nizoral Crème sur les yeux. Lavez-vous les mains après avoir appliqué Nizoral Crème.

Si vous utilisez un corticoïde à usage externe (p.ex. sous la forme d'onguent, de lotion ou de crème), vous devez absolument en informer votre médecin. Celui-ci décidera de quand et comment il convient de commencer votre traitement avec Nizoral Crème. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Veuillez également consulter votre médecin lors d'une éruption cutanée importante.

Nizoral Crème contient par 1 g

- 200 mg du propylène glycol (E 1520), qui peut provoquer des irritations de la peau
- 75 mg d'alcool stéarylique et 20 mg d'alcool cétylique, qui peuvent provoquer des irritations de la peau localisées (par ex. dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Nizoral Crème peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



Si vous êtes enceinte, si vous avez l'intention de le devenir ou si vous allaitez, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser Nizoral Crème.

L'application de crème dans la région de la poitrine doit être évitée si vous utilisez le produit pendant l'allaitement.

Comment utiliser Nizoral Crème?

Adultes

Sauf prescription contraire du médecin, Nizoral Crème sera appliqué de la façon suivante:

Infections cutanées mycosiques sur le tronc, la région inguinale, les pieds et les mains: Appliquer Nizoral Crème 1 fois par jour sur les surfaces de peau atteintes.

Le traitement doit être poursuivi sans interruption jusqu'à la disparition totale des foyers mycosiques et il doit être prolongé encore plusieurs jours au-delà de celle-ci. En général, le traitement dure de 2 à 4 semaines; une mycose des pieds demande une durée de traitement plus longue de 4 à 6 semaines.

Eczéma séborrhéique: Appliquer Nizoral Crème 1 à 2 fois par jour sur les zones de peau touchées. La durée usuelle de traitement est de 2 à 4 semaines. Si le médecin le prescrit, Nizoral Crème peut ensuite encore être appliqué 1 à 2 fois par semaine pour maintenir l'effet.

Si après quatre semaines de traitement, aucune amélioration ne survient, consulter le médecin.

Lors du premier emploi de Nizoral Crème, dévisser le capuchon et percer la membrane de l'orifice avec la pointe qui se trouve dans la partie extérieure du capuchon.

Laver d'abord les surfaces atteintes puis bien les sécher. Appliquer ensuite Nizoral Crème du bout des doigts sur les parties de peau infectées ainsi qu'au-delà de leurs bords. Se laver les mains pour éviter de contaminer une autre partie du corps ou d'autres personnes. Il convient de changer fréquemment les vêtements pour favoriser le succès du traitement. En cas de mycose des pieds, on recommande l'emploi adjuvant d'une poudre ou d'un spray antimycosique sur les bas et dans les chaussures.

Enfants et adolescents

On ne dispose que de données limitées concernant l'utilisation et la sécurité de Nizoral Crème chez les enfants et les adolescents. Chez les enfants plus âgés et les adolescents, l'utilisation doit se faire conformément à la prescription du médecin.

Compte tenu d'une éventuelle absorption du principe actif, les nourrissons ne doivent pas être traités par Nizoral Crème.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Nizoral Crème peut-il provoquer?

L'utilisation de Nizoral Crème peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Des réactions au site d'application, telles que sensation de brûlure cutanée, rougeur de la peau ou démangeaisons.

Occasionnel (concerne 1 à 10 sur 1000)

Des réactions d'hypersensibilité, une éruption cutanée, une peau qui pèle ou se décolle, une peau collante ou sèche, une sensation désagréable ou des sensations anormales au niveau du site d'application, des irritations cutanées, un eczéma local, des inflammations ou des saignements.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

L'application d'une quantité de Nizoral Crème excessive ou plus souvent que celle recommandée peut entraîner l'apparition d'une rougeur et/ou d'un gonflement de la peau, ou d'une sensation de brûlure. Dans ce cas, arrêtez le traitement par Nizoral Crème afin que les symptômes puissent disparaître.



Nizoral Crème ne doit pas être avalé. En cas d'ingestion accidentelle de Nizoral Crème, contactez votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Cela est notamment valable pour les effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après ouverture se conserve 6 mois.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Ne pas avaler.

Remarques complémentaires

Une fois le traitement terminé, rapportez le restant de médicament à votre médecin ou pharmacien, qui se chargera de l'élimination de manière appropriée.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Nizoral Crème?

Principes actifs

1 g de Nizoral Crème contient 20 mg de kétoconazole.

Excipients

Propylène glycol (E 1520), alcool stéarylique, alcool cétylique, stéarate de sorbitane, polysorbate 60, myristate d'isopropyle, sulfite de sodium (E 221), polysorbate 80, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

46100 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Nizoral Crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Tube de 30 g de crème.

Titulaire de l'autorisation

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

