

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere*). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucofor® 300 mg, capsula

OM Pharma Suisse SA

Che cos'è Mucofor e quando si usa?

Il principio attivo contenuto nel Mucofor è l'erdosteina.

Su prescrizione medica, viene usato per il trattamento delle malattie respiratorie che provocano la formazione di secrezioni viscosi, che non possono o solo insufficientemente essere espettorate, come la bronchite acuta e gli accessi acuti della bronchite cronica.

Mucofor fluidifica le mucosità, facilitando la loro eliminazione e perciò la respirazione; questo contribuisce a calmare la tosse.

Mucofor deve essere preso solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Si può sostenere l'azione di Mucofor con un apporto sufficiente di liquido o, se fuma, rinunciando di fumare.

Quando non si può assumere/usare Mucofor?

Non si deve somministrare Mucofor a bambini e adolescenti.

Se soffre d'ipersensibilità (allergia) all'erdosteina, d'ulcera dello stomaco o di malattie gravi del fegato o dei reni, non deve prendere Mucofor. Il suo medico sa cosa fare in tali casi.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Mucofor?

Su pazienti che soffrono di disturbi del fegato, Mucofor deve essere amministrato con prudenza. Si può invece prendere Mucofor senza problema con antibiotici (p.es. Clamoxyl, Erythrocine) o con preparati a base di teofillina (p.es. Unifyl, Euphyllin), se il suo medico Le ha prescritto tali prodotti.

In caso di apparizione di reazioni d'ipersensibilità (vedere «Quali effetti collaterali può avere Mucofor?»), deve immediatamente interrompere il trattamento con Mucofor e informarne il suo medico.

Quando prende Mucofor non dovrebbe prendere allo stesso tempo dei medicinali contro la tosse che contengono principi attivi come la codeina, il destrometorfano o la noscapina. Un tale prodotto contro la tosse, impedendo l'espettorazione, può provocare un'accumulazione di secrezioni liquefatte da Mucofor nei bronchi, cosa che aumenta il rischio di un'infezione e di uno spasmo delle vie respiratorie.

Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Mucofor durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione, Mucofor non dovrebbe essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Mucofor?

Si può prendere Mucofor indipendentemente dai pasti.

Salvo altra prescrizione del medico, prendere:



Adulti: 1 capsula da 300 mg, 2 volte al giorno.

Inghiottire le capsule senza masticarle, con un poco di liquido.

Il medico determinerà la durata del trattamento, generalmente 7 a 10 giorni. Se i disturbi persistono oltre 10 giorni, deve consultare di nuovo il suo medico.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Mucofor?

Con l'assunzione di Mucofor possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000):

Leggeri dolori o bruciori gastrici, nausea.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000):

Diarrea.

Reazioni d'ipersensibilità (allergie), con eruzioni cutanee, traspirazione, palpitazioni cardiache e/o delle difficoltà respiratorie.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000):

Disturbi del gusto reversibile in qualche settimana.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare il Mucofor a temperatura ambiente (15-25 °C), in un luogo secco, al riparo dalla luce e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucofor?

Principi attivi

1 capsula contiene 300 mg d'erdosteina.

Eccipienti

Cellulosa microcristallina, povidone K 30, stearato di magnesio; componenti della capsula: gelatina, biossido di titanio (E171), ossido ferrico giallo (E172), indigotina (E132).

Numero dell'omologazione

48589 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Mucofor? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia, su prescrizione medica.

Scatole da 20 capsule a 300 mg.

Titolare dell'omologazione

OM Pharma Suisse SA, Villars-sur-Glâne

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

