

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez des renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Swidro Ginseng Extrait, capsules

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que les capsules Swidro Ginseng Extrait et quand doivent-elles être utilisées?

Les capsules Swidro Ginseng Extrait contiennent un extrait éthanolique sec de la racine rouge de Panax Ginseng C.A. Meyer, un produit naturel que l'on trouve dans les montagnes du nord-est de la Chine. La racine de ginseng y est utilisée depuis plus de 2000 ans.

Les capsules Swidro Ginseng Extrait sont utilisées pour améliorer les performances physiques et psychiques, en cas de problèmes de concentration, au cours de la convalescence ainsi qu'en cas d'épuisement et de faiblesse générale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Une nourriture déséquilibrée, une consommation excessive de sel et de matières grasses ainsi que la consommation de tabac peuvent diminuer vos capacités et sont donc à éviter.

Avant de commencer le traitement avec les capsules Swidro Ginseng Extrait, il convient de déterminer si les symptômes ne sont pas dus à une pathologie sous-jacente qui requiert un traitement spécifique. Consultez un spécialiste pour le savoir. Consultez votre médecin si les troubles persistent après une période de temps appropriée.

Le ginseng peut faire baisser la glycémie. Pour cette raison, les patients diabétiques ne doivent prendre des médicaments contenant du ginseng qu'après avoir consulté leur médecin.

Quand les capsules Swidro Ginseng Extrait ne doivent-elles pas être prises ou seulement avec précaution?

Les capsules Swidro Ginseng Extrait ne doivent pas être prises en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants (voir «Que contiennent les capsules Swidro Ginseng Extrait?»).

Aucune étude n'a été menée sur l'administration de ce médicament à des enfants. Pour cette raison, ne pas l'administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Une interaction avec des médicaments qui inhibent la coagulation sanguine (diminution de l'effet d'anticoagulants oraux tels que phénprocoumone, acénocoumarol, warfarine) ne peut pas être exclue. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!



Les capsules Swidro Ginseng Extrait peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser les capsules Swidro Ginseng Extrait?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans: prendre 1 capsule 1 à 2 fois par jour, sans la mâcher, avec un peu de liquide, de préférence avant les repas.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

D'une manière générale, le traitement peut s'étendre sur un à deux mois. Par mesure de précaution, veuillez demander conseil à votre médecin avant une utilisation prolongée.

L'utilisation et la sécurité des capsules Swidro Ginseng Extrait n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans; ce médicament ne doit donc pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.

Quels effets secondaires les capsules Swidro Ginseng Extrait peuvent-elles provoquer?

Dans de rares cas, la prise de doses élevées de capsules Swidro Ginseng Extrait peut provoquer des troubles gastriques. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Conserver ce médicament à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention EXP sur le récipient. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contiennent les capsules Swidro Ginseng Extrait?

1 capsule contient: 220 mg d'extrait éthanolique sec de la racine rouge de Panax Ginseng C.A. Meyer (DER: 10-15:1), correspondant à 22 mg de ginsénosides totaux (calculé comme ginsénoside Rg1), agent d'extraction: éthanol 75 %vol. Cette préparation contient en outre des excipients.

Numéro d'autorisation

57514 (Swissmedic).

Où obtenez-vous les capsules Swidro Ginseng Extrait? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 et 60 capsules.



Titulaire de l'autorisation

PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co., 9500 Wil SG

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2006 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

