

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Fortakehl® D4, capsules

Médicament homéopathique

Quand Fortakehl® D4, capsules est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Fortakehl® D4, capsules peut être utilisé en cas de troubles de l'estomac.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Fortakehl® D4, capsules peut être pris simultanément.

Quand Fortakehl® D4, capsules ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Fortakehl® D4, capsules ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à la pénicilline ou à des substances similaires. Lors de troubles de la digestion chez les enfants de moins de 12 ans, il faut consulter le médecin. La préparation ne doit par conséquent pas être utilisée chez les enfants de moins de 12 ans sans consultation médicale. Si les troubles persistent sans cesse ou s'ils ne s'améliorent pas après 2 semaines, il faut consulter le médecin. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si – vous souffrez d'une autre maladie,

- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Fortakehl® D4, capsules peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Fortakehl® D4, capsules?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 1-3 capsules par jour avant le petit déjeuner ou le soir avant de se coucher, avec un peu de liquide. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fortakehl® D4, capsules peut-il provoquer?



La prise de Fortakehl® D4, capsules peut provoquer les effets secondaires suivants: Dans des cas très rares des réactions d'hypersensibilité (réactions allergiques au principe active). Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Fortakehl® D4, capsules et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Fortakehl® D4, capsules?

1 capsule contient:

330 mg Penicillium roquefortii D4 trituration (HAB, 6).

Cette préparation contient en outre du lactose comme excipient. Capsule: hypromellose.

Numéro d'autorisation

50287 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Fortakehl® D4, capsules? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 20 capsules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

