

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quentakehl® D3, supposte

Medicamento omeopatico

Quando si usa Quentakehl® D3, supposte?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Quentakehl® D3, supposte può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di infezioni grippali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Quentakehl® D3, supposte. In caso che non ci sia un miglioramento si deve contattare il medico.

Quando non si può usare Quentakehl® D3, supposte e quando il suo uso richiede prudenza?

Quentakehl® D3, supposte non può essere usato in caso di allergia contro la penicillina e nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Quentakehl® D3, supposte durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Quentakehl® D3, supposte?

Salvo diversa prescrizione medica negli adulti introdurre 1 supposta al giorno nell'ano prima di andare a letto. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Quentakehl® D3, supposte nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Quentakehl® D3, supposte?

In seguito all'applicazione di Quentakehl® D3, supposte possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Reazioni allergiche contro la penicillina e simili. Se osserva altri effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa



il trattamento con Quentakehl® D3, supposte e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Quentakehl® D3, supposte?

1 supposta contiene:

200 mg Penicillium glabrum D3 (sin.: Penicillium frequentano D3) trituration (HAB; 6).

Questo preparato contiene inoltre una sostanza ausiliaria: Grasso duro.

Numero dell'omologazione

52576 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Quentakehl® D3, supposte? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 supposte.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

