

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Sanukehl Coli D7, solution injectable (s.c.)

Médicament homéopathique

Quand Sanukehl Coli D7 est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Sanukehl Coli D7 peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas de cholécystite, cystite, prostatite et gastro-entérite chronique.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Sanukehl Coli D7 peut être utilisé simultanément.

Quand Sanukehl Coli D7 ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser en cas de:

- hypersensibilité connue à *Escherichia coli*
- maladies auto-immunes
- enfants de moins de 12 ans
- grossesse et allaitement

Il n'existe pas suffisamment de données documentées concernant l'utilisation de Sanukehl Coli D7 chez les adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, son utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans n'est pas recommandée.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ampoule, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Les médicaments ou traitements immunosuppresseurs peuvent altérer l'efficacité de Sanukehl Coli D7. Un intervalle de 4 semaines doit être observé avant et après le traitement par des vaccins vivants administrés par voie orale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Sanukehl Coli D7 peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sanukehl Coli D7 ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment utiliser Sanukehl Coli D7?



Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Posologie pour l'adulte / mode d'emploi chez l'adulte: injecter 1 ampoule à 1 ml 1-3 fois par semaine par voie sous-cutanée.

Il n'existe pas suffisamment de données documentées concernant l'utilisation de Sanukehl Coli D7 chez l'enfant et l'adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, son utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans n'est pas recommandée. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Quels effets secondaires Sanukehl Coli D7 peut-il provoquer?

La prise / l'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Sanukehl Coli D7 et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

En raison de la présence de composants organiques spécifiques dans Sanukehl Coli D7, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «À utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Instructions d'élimination

Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies, les drogueries, au cabinet médical ou dans les centres de collecte.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Sanukehl Coli D7?

1 ampoule de 1 ml de liquide contient:

Principes actifs

Escherichia coli extractum cellulae (lyophil., steril.) D7 aquos (HAB 5b) 1 ml

Excipients

chlorure de sodium (équivalent à 3,54 mg de sodium), eau pour injection

Numéro d'autorisation

53062 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Sanukehl Coli D7? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 1, 10 et 50 ampoules.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

