

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sanukehl Coli D7, soluzione per iniezioni (s.c.)

Medicamento omeopatico

Quando si usa Sanukehl Coli D7?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Sanukehl Coli D7 può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di colecistite, cistite, prostatite e gastroenterite cronica.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Sanukehl Coli D7.

Quando non si può usare Sanukehl Coli D7 e quando il suo uso richiede prudenza?

Non usare in caso di:

- ipersensibilità nota all'*Escherichia coli*
- malattie autoimmuni
- bambini di età inferiore ai 12 anni
- gravidanza e allattamento

Non ci sono abbastanza esperienze documentate sull'uso di Sanukehl Coli D7 per gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Pertanto, il suo uso negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non è raccomandato. Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per fiala, cioè essenzialmente «senza sodio».

Farmaci o terapie immunosoppressive possono compromettere l'efficacia di Sanukehl Coli D7. È necessario rispettare un intervallo di 4 settimane prima e dopo la somministrazione di vaccini vivi via orale. Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può usare Sanukehl Coli D7 durante la gravidanza o l'allattamento?

Sanukehl Coli D7 non deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Sanukehl Coli D7?

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Posologia negli adulti/Usi per adulti: iniettare 1-3 volte alla settimana 1 fiala di 1 ml per via sottocutanea.



L'uso e la sicurezza di Sanukehl Coli D7 nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono ancora stati studiati. Pertanto, il suo uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non è raccomandato. Non usare in bambini di età inferiore ai 12 anni.

Quali effetti collaterali può avere Sanukehl Coli D7?

Con l'assunzione/l'applicazione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Sanukehl Coli D7 e informi il suo medico o il suo farmacista.

A causa del contenuto di componenti organici specifici in Sanukehl Coli D7, possono verificarsi reazioni di ipersensibilità.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Istruzioni per lo smaltimento:

I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sanukehl Coli D7?

1 fiala di 1 ml di liquido contiene:

Principi attivi

Escherichia coli extractum cellulae (lyophil., steril.) D7 aquos (HAB 5b) 1 ml

Sostanze ausiliarie

cloruro di sodio (equivalente a 3,54 mg di sodio), acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

53062 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Sanukehl Coli D7? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 1, 10 e 50 fiale.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach



Fabbricante

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG, Postfach 1355, D-27316 Hoya

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

