

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Crampex, Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Crampex angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Crampex bei Beschwerden wie Arm-, Bein- Waden und Fusskrämpfen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Bitte nehmen Sie Crampex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Crampex gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Crampex nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Brom sowie bei Kindern unter 2 Jahren.

Bei starken Beschwerden ist die frühzeitige Konsultation eines Arztes/einer Ärztin angezeigt.

Treten die Krämpfe über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen auf, so ist ein Arzt, eine Ärztin zu konsultieren.

Bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren nur nach Rücksprache mit einem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. einer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin anwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- wenn sie Allergien haben
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen.

Darf Crampex während einer Schwangerschaft oder in Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.



Wie verwenden Sie Crampex?

Falls von Ihrem Arzt bzw. Ärztin nicht anders verschrieben:

Akute Beschwerden (Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren):

Stündlich eine Tablette langsam im Mund zergehen lassen, bis zum Verschwinden der Beschwerden.

Leichte Beschwerden und zu Ausheilen:

Erwachsene bis 6 Tabletten täglich.

Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis 18 Jahren bis 4 Tabletten täglich.

Bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren nur nach Rücksprache mit einem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. einer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin anwenden.

Nicht anwenden bei Kindern unter 2 Jahren.

Essen oder Trinken Sie 10 Minuten vor und nach der Einnahme nichts.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Crampex haben?

Für Crampex sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zum auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Arzneimittel ausser Reichweite von Kindern und bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Crampex enthalten?

1 Tablette à 100mg enthält: Wirkstoffe:

Ambra grisea (HAB) D3 12.5mg, Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D6 12.5mg (Ph.Eur.Hom.1.1.3), Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D6 12.5mg, Cuprum aceticum (HAB) D4 12.5mg (HAB 6), Kalium bromatum (HAB) D3 12.5mg (HAB 6), Magnesium phosphoricum (HAB) D4 12.5mg, Acidum sillicicum (HAB) D6 12.5mg, Zincum oxydatum D3 12.5mg (HAB 6).

Hilfsstoffe:

Milchzucker (Lactose Monohydrat) 100mg.



Zulassungsnummer

33'208 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Crampex? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen zu 100 und 250 Tabletten.

Zulassungsinhaberin

Ergo-pharm GmbH 4415 Lausen BL (Schweiz)

Diese Packungsbeilage wurde im Dezember 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

