

Informations à destination des patientes et patients.

Veuillez lire attentivement cette notice, car elle contient des informations importantes.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin ou vous l'avez obtenu dans une pharmacie ou une droguerie sans ordonnance médicale. Pour en tirer le meilleur parti, veuillez utiliser le médicament conformément à la notice présente dans l'emballage ou aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez la notice, vous voudrez peut-être la relire plus tard.

Crampex, comprimés

Médicament homéopathique

Quand Crampex est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, Crampex peut être utilisé en cas de douleurs telles que des crampes du bras, de la jambe, du mollet ou du pied.

L'utilisation de ce médicament dans le cadre des usages mentionnés repose exclusivement sur des principes thérapeutiques homéopathiques.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Ne prenez Crampex qu'après avoir consulté votre médecin si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au glucose.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Crampex peut être pris en simultanément.

Quand Crampex ne doit-il pas être pris/utilisé ou seulement avec précaution ?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au brome et chez les enfants de moins de 2 ans.

Il est conseillé de consulter rapidement un médecin en cas de douleurs importantes.

Si les crampes persistent pendant plus de 10 jours, il faut consulter un médecin.

N'utiliser qu'après consultation d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un droguiste chez les enfants de 2 à 6 ans.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'autres maladies,
- vous êtes allergique,
- vous prenez d'autres médicaments (y compris en vente libre!).

Crampex peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le produit est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez si possible renoncer à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement ou demander conseil au médecin, au pharmacien ou au droguiste.

Comment utiliser Crampex ?

Sauf indication contraire de votre médecin :

Douleurs aiguës (adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans):



Laisser fondre lentement dans la bouche un comprimé toutes les heures jusqu'à disparition de la douleur.

Douleurs légères ou pour une guérison complète :

Adultes : jusqu'à 6 comprimés par jour.

Enfants à partir de 6 ans et adolescents jusqu'à 18 ans: jusqu'à 4 comprimés par jour.

N'utiliser qu'après consultation ou sur prescription d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un droguiste chez les enfants de 2 à 6 ans.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.

Ne rien manger et ne rien boire pendant les 10 minutes qui précèdent et qui suivent la prise du médicament.

Respectez la posologie indiquée dans la notice ou prescrite par votre médecin. Si le traitement n'apporte pas l'amélioration souhaitée chez l'enfant, il convient de lui faire consulter un médecin. Si vous estimez que l'effet du médicament est trop faible ou trop fort, veuillez-vous adresser à votre médecin, votre pharmacien(ne) ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Crampex peut-il provoquer ?

Aucun effet secondaire n'a été observé à ce jour pour Crampex dans le cadre d'une utilisation conforme à l'usage auquel il est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conseils de conservations

Tenir hors de portée des enfants et conserver à température ambiante (15-25°C).

Autres remarques

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Crampex ?

1 comprimé de 100 mg contient : Substances actives

Ambra grisea (HAB) D3 12,5 mg, Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D6 12,5 mg (Ph.Eur.Hom.1.1.3), Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D6 12,5 mg, Cuprum aceticum (HAB) D4 12,5 mg (HAB 6), Kalium bromatum (HAB) D3 12,5 mg (HAB 6), Magnesium phosphoricum (HAB) D4 12,5 mg,

Acidum sillicicum (HAB) D6 12,5 mg, Zincum oxydatum D3 12,5 mg (HAB 6).

Excipients

Lactose (lactose monohydraté) 100 mg

Numéro d'autorisation

33'208 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Crampex ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Boîtes de 100 et 250 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

Ergo-pharm GmbH 4415 Lausen BL (Suisse)

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

