

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Crapex, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Crapex?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Crapex può essere usato per disturbi quali crampi alle braccia, alle gambe, ai polpacci e ai piedi.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Assuma Crapex solo dopo aver consultato il suo medico se sa di soffrire di un'intolleranza allo zucchero.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Crapex.

Quando non si può usare Crapex e quando la sua somministrazione suo uso richiede prudenza?

Non utilizzare in caso di ipersensibilità al bromo e nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Se i sintomi sono gravi, è consigliabile consultare un medico il prima possibile.

Se i crampi si verificano per un periodo superiore a 10 giorni, è necessario consultare un medico.

Nei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni utilizzare solo dopo aver consultato un medico, un farmacista o un droghiere.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Crapex durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente.

Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Crapex?

Se non prescritto diversamente dal suo medico:



Disturbi acuti (adulti, adolescenti e bambini a partire da 6 anni):

sciogliere lentamente in bocca una compressa ogni ora fino alla scomparsa dei sintomi.

Disturbi lievi e per una completa guarigione:

adulti fino a 6 compresse al giorno.

Bambini da 6 anni e adolescenti fino a 18 anni fino a 4 compresse al giorno.

Nei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni utilizzare solo dopo aver consultato il medico, farmacista o droghiere o secondo la loro prescrizione.

Non utilizzare nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Non mangi né beva niente nei 10 minuti che precedono e seguono l'assunzione del medicamento.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Crampex?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Crampex.

Se ciononostante osservasse effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25°)

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Crampex?

1 compressa da 100 mg contiene: Principi attivi

Ambra grisea (HAB) D3 12.5 mg, Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D6 12.5 mg (Ph.Eur.Hom.1.1.3), Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D6 12.5 mg, Cuprum aceticum (HAB) D4 12.5 mg (HAB 6), Kalium bromatum (HAB) D3 12.5 mg (HAB 6), Magnesium phosphoricum (HAB) D4 12.5 mg, Acidum sillicicum (HAB) D6 12.5 mg, Zincum oxydatum D3 12.5 mg (HAB 6).

Sostanze ausiliarie

Zucchero del latte (lattosio monoidrato) 100 mg.

Numero dell'omologazione

33'208 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Crampex? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.



Confezioni da 100 e 250 compresse.

Titolare dell'omologazione

Ergo-pharm GmbH 4415 Lausen BL (Svizzera)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

