

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

apo-STOM, Tropfen zum Einnehmen

Wann wird apo-STOM angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild und dem Therapieprinzip der Spagyrik kann apo-STOM bei Magenfunktionsstörungen mit Erbrechen und Übersäuerung angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung und dem Therapiekonzept der Spagyrik.

Was sollte dazu beachtet werden?

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden. Wenn die Beschwerden ununterbrochen anhalten, oder wenn nach zwei Wochen keine Besserung eingetreten ist, oder wenn Sie regelmässig unter Magenbeschwerden leiden, sollten Sie einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob apo-STOM gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf apo-STOM nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

apo-STOM darf nicht bei Säuglingen und Kleinkindern (28 Tage – 23 Monate) und Neugeborenen (0 -27 Tage) angewendet werden. apo-STOM darf bei Kindern unter 12 Jahren nur auf ärztliche Verschreibung angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält 91 mg Ethanol (Alkohol) pro 20 Tropfen, entsprechend 208 mg/ml (20,8 % w/v). Die Menge in 20 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier, oder 1 ml Wein. Gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf apo-STOM während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit werden?

Das Arzneimittel darf während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht eingenommen werden.

Wie verwenden Sie apo-STOM?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Erwachsene 3 mal täglich 20 Tropfen, Jugendliche ab 12 Jahren 3 mal täglich 10 Tropfen, jeweils vor den Mahlzeiten in etwas Wasser verdünnt einnehmen.



apo-STOM darf nicht bei Säuglingen und Kleinkindern (28 Tage – 23 Monate) und Neugeborenen (0 – 27 Tage) angewendet werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann apo-STOM haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie apo-STOM ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Für apo-STOM sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit "verwendbar bis" bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in apo-STOM enthalten?

1 g Flüssigkeit (= 1,03 ml / 46 Tropfen) enthält:

Achillea millefolium (HAB) D12 85 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite (Ph.Eur.Hom.) spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Colchicum autumnale (HAB) D6 125 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D4 145 mg

Natrium phosphoricum (HAB) D4 145 mg

Robinia pseudoacacia e cortice spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Stibium sulfuratum nigrum (HAB) D6 125 mg

Strychnos nux-vomica e semine (Ph.Eur.hom.) spag. Peka D12 (HAB 47b) 85 mg

Hilfsstoffe

Ethanol, gereinigtes Wasser

Enthält 26 % V/V Alkohol.

Zulassungsnummer



55328 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie apo-STOM? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 50 ml.

ZulassungsinhaberIn

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

HerstellerIn

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Diese Packungsbeilage wurde im Oktober 2024 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

