

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

apo-STOM, liquide oral en gouttes

Quand apo-STOM est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes thérapeutiques de la spagyrie, apo-STOM peut être utilisé sur prescription de votre médecin en cas de perturbations de la fonction de l'estomac avec vomissement et hyperacidité.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes thérapeutiques de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Lors de troubles de la digestion chez les enfants de moins de 12 ans, il faut consulter le médecin. Le médicament ne doit par conséquent pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans sans consultation médicale. Si les perturbations persistent sans cesse, si après deux semaines de traitement, un rétablissement ne s'est pas produit ou si vous souffrez souvent de perturbations de l'estomac, il est recommandé de consulter votre médecin. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si apo-STOM peut être pris simultanément.

Quand apo-STOM ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

apo-STOM ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés (0 - 27 jours), les nourrissons et les petits enfants (28 jours - 23 mois). apo-STOM ne doit être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans que sur prescription médicale.

Ce médicament contient 91 mg d'alcool (éthanol) par dose (20 gouttes), ce qui correspond à 208 mg/ml (20,8 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin.

La teneur en alcool représente un risque pour la santé des patients souffrant d'alcoolisme.

Il faut en tenir compte chez les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que chez les enfants et les patients présentant un risque accru en raison d'une maladie du foie ou d'une épilepsie.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

apo-STOM peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Le médicament ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser apo-STOM?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes : 20 gouttes 3 fois par jour.

Adolescents à partir de 12 ans: 10 gouttes 3 fois par jour.

À prendre avant les repas, diluer dans un peu d'eau.

apo-STOM ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés (0 - 7 jours), les nourrissons et les jeunes enfants (28 jours - 23 mois).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires apo-STOM peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec apo-STOM et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de apo-STOM n'a été constaté à ce jour, en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient apo-STOM?

1 g de liquide (= 1,03 ml / 46 gouttes) contient:

Achillea millefolium (HAB) D12 85 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite (Ph.Eur.Hom.) spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Colchicum autumnale (HAB) D6 125 mg

Citrullus colocynthis (HAB) D4 145 mg



Natrium phosphoricum (HAB) D4 145 mg

Robinia pseudoacacia e cortice spag. Peka D4 (HAB 47a) 145 mg

Stibium sulfuratum nigrum (HAB) D6 125 mg

Strychnos nux-vomica e semine (Ph.Eur.hom.) spag. Peka D12 (HAB 47b) 85 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée.

Contient 26 % de vol. d'éthanol

Numéro d'autorisation

55328 (Swissmedic)

Où obtenez-vous apo-STOM? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

