

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Homéovox®, Tabletten

Boiron SA

Homöopathisches Arzneimittel

Wann wird Homéovox angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Homéovox bei Heiserkeit, Ermüdung der Stimmbänder (Redner, Sänger ...) und Kehlkopfentzündungen angewendet werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschliesslich auf den Prinzipien einer homöopathischen Therapierichtung.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verordnet hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Homéovox gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf Homeovox nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Die Symptome bei Kindern unter 6 Jahren müssen vorher ärztlich abgeklärt werden. Das Medikament sollte daher bei Kindern unter 6 Jahren nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden. Bei hohem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eingetreten ist, suchen Sie bitte einen Arzt bzw. eine Ärztin auf.

Enthält 450 mg Saccharose und 144 mg Laktose pro Dosis (2 Tabletten). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Wenn Ihnen Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben, wenden Sie sich vor der Einnahme dieses Arzneimittels an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Dies kann schädlich für die Zähne sein.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Homéovox während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Homéovox?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: Jede Stunde 2 Tabletten langsam lutschen. Je nach Besserung die Abstände zwischen den Einnahmen vergrössern. Bei Kindern lösen Sie die Tabletten bei Bedarf in etwas Wasser auf.



Die Symptome bei Kindern unter 6 Jahren müssen vorher ärztlich abgeklärt werden. Das Medikament sollte daher bei Kindern unter 6 Jahren nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Homéovox haben?

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Homéovox ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten oder Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Für Homéovox sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Homéovox enthalten?

Eine Tablette zu 300 mg enthält:

Wirkstoffe

Aconitum napellus (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.125 mg

Arum triphyllum (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.125 mg

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.125 mg

Bryonia (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.125 mg

Ferrum phosphoricum (Ph.Fr.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2): 0.125 mg

Hepar sulfuris 6 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2): 0.125 mg

Kalium bichromicum (Ph.Eur.Hom.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.3.1.3): 0.125 mg

Spongia tosta (Ph.Fr.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.11): 0.125 mg

Hilfsstoffe

Saccharose 225 mg, Laktose 72 mg und Magnesiumstearat.

Zulassungsnummer

50557 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Homéovox? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung mit 60 Tabletten.



Zulassungsinhaberin

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Herstellerin

BOIRON SA – Frankreich

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

