

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dentohexin 0,2%

Streuli Pharma AG

Was ist Dentohexin 0,2% und wann wird es angewendet?

Dentohexin wirkt gegen Bakterien und Pilze, die im Mund- und Rachenraum Entzündungen verursachen können.

Dentohexin dient zur Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum; wie zum Beispiel bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, Zahnbetterkrankungen, Aphthen und Prothesendruckstellen. Dentohexin wird vor und nach zahnärztlichen Eingriffen verwendet.

Daneben kann Dentohexin zur Unterstützung bei eingeschränkter Mundhygiene, zur Unterstützung der Kariesprophylaxe, bei Mundgeruch und Zahnbelag verwendet werden.

Wann darf Dentohexin 0,2% nicht eingenommen / angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei Geschwüren oder offenen Stellen mit Schleimhautablösungen im Mund.

Wann ist bei der Einnahme / Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?

Bei regelmässigem Gebrauch kann eine behebbare Verfärbung der Zähne und Zunge auftreten. Dentohexin nicht in Auge oder Gehörgang bringen.

Chlorhexidin löst in sehr seltenen Fällen Allergien aus. Typische Zeichen sind Juckreiz, allgemeine Hautrötung, Nesselfieber, Asthma oder vereinzelt Kreislaufreaktionen. Beenden Sie sofort die Anwendung von Dentohexin und kontaktieren Sie umgehend Ihren Zahnarzt bzw. Ihre Zahnärztin oder Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Längere Anwendung von Dentohexin sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Zahnarzt bzw. mit der Ärztin oder Zahnärztin erfolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Dentohexin 0,2% während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Dentohexin nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin anwenden.

Wie verwenden Sie Dentohexin 0,2%?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Die Dentohexin-Lösung wird mit gleichen Teilen Wasser verdünnt.

Morgens und abends nach den Mahlzeiten, vorzugsweise 15 Min. nach dem Zähneputzen (Mund zwischen Zähneputzen und der Anwendung von Dentohexin gründlich mit Wasser spülen), mit je 5 ml Dentohexin-Lösung und 5 ml Wasser (s. Einteilung auf dem beiliegenden Messbecher) ca. 20 Sekunden lang spülen



und gurgeln. Lösung ausspucken, nicht schlucken oder nachspülen.

Bei Prothesen-Entzündungen die Prothese reinigen und anschliessend während 5 Minuten in unverdünnte Dentohexin-Lösung einlegen. Mund zusätzlich wie oben beschrieben spülen.

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Behandlung zahnärztlich oder ärztlich in halbjährlichem Abstand zu überprüfen.

Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern unter 6 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt/Zahnarzt bzw. von der Ärztin/Zahnärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Zahnarzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin/Zahnärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Dentohexin 0,2% haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dentohexin auftreten:

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Anwendern)

Eine gelbliche, manchmal auch dunklere Verfärbung der Zähne und Füllungen wurde bei langfristiger Anwendung häufig beobachtet. Durch gründliches Zähneputzen mit einer reinigenden Zahnpasta vor der Anwendung mit Dentohexin kann diese Verfärbung weitgehend verhindert werden. In Ausnahmefällen müssen die Zähne von einem Fachmann gereinigt werden.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Anwendern)

Störungen der Geschmacksempfindung oder Taubheitsgefühl der Zunge.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Anwendern)

Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen (gerötetes, schmerzendes Zahnfleisch, allergische Reaktionen der Haut, Schleimhäute und Atmungsorgane) auf (siehe «Wann ist bei der Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?»). In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25 °C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt/Zahnarzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin/ Zahnärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Dentohexin 0,2% enthalten?

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung für die Mundhöhle enthält

Wirkstoffe

Chlorhexidini digluconas 2 mg,

Hilfsstoffe

Glycerolum (85 per centum), Polysorbatum 20, Menthae piperitae aetherolum, Rosae aetherolum, Cinnamomi aetherolum, Anisi aetherolum, E 127 (Erythrosin), Aqua purificata.



Zulassungsnummer

50174 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dentohexin 0,2%? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Lösung (mit Messbecher) zu 100 ml, 200 ml und 1000 ml.

ZulassungsinhaberIn

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2020 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

