

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dentohexin 0,2%

Streuli Pharma AG

Che cos'è Dentohexin 0,2% e quando si usa?

Dentohexin agisce contro batteri e funghi, che possono causare infiammazioni nella bocca e nella faringe.

Dentohexin serve per trattare malattie infiammatorie e infettive nella bocca e nella faringe; come per esempio nelle infiammazioni alle gengive, emorragia gengivale, malattie del parodonto, afte e posti di pressione della protesi.

Dentohexin viene usato prima e dopo un intervento dentistico.

Oltre a ciò Dentohexin può essere usato per supportare l'igiene della bocca, la prevenzione della carie, e in caso di alito cattivo e placca dentale.

Quando non si può assumere/usare Dentohexin 0,2%?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. In caso di ulcere o lesioni della mucosa nella bocca.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Dentohexin 0,2%?

In caso di uso regolare, una colorazione reversibile dei denti e della lingua può apparire. Non applicare Dentohexin negli occhi o nei canali auditivi.

In casi molto rari la clorexidina provoca delle allergie. Segnali tipici comprendono prurito, arrossamento cutaneo generale, orticaria, asma oppure, in casi isolati, reazioni circolatorie. Interrompa subito l'utilizzo di Dentohexin e contatti immediatamente il suo dentista o il suo medico.

L'uso prolungato di Dentohexin deve soltanto aver luogo dopo aver consultato il medico o la dentista.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Dentohexin 0,2% durante la gravidanza o l'allattamento?

Dentohexin può essere usato durante la gravidanza o l'allattamento solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Dentohexin 0,2%?

Adulti e bambini a partire da 6 anni

Dentohexin viene diluito con acqua in parti uguali.

Mattina e sera dopo i pasti, di preferenza 15 minuti dopo aver pulito i denti (risciacquare accuratamente la bocca con acqua nel periodo tra il lavaggio dei denti e l'uso di Dentohexin), sciacquare la bocca e fare dei gargarismi per circa 20 secondi con 5 ml di Dentohexin diluiti in 5 ml d'acqua (vedere graduazione sulla misura per dosaggio, inclusa). Sputare la soluzione, non ingoiare o risciacquare.

In caso d'infiammazioni dovute a protesi, pulire la protesi ed infine immergerla per 5 minuti in Dentohexin non diluito. Oltre a ciò sciacquare la bocca come descritto sopra.



Il medico o il dentista controlleranno il trattamento nei bambini o adolescenti in un intervallo di 6 mesi.

L'uso e la sicurezza nei bambini sotto i 6 anni non sono stati ancora testati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico/dentista. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico/dentista, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dentohexin 0,2%?

Con l'applicazione di Dentohexin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

In alcuni casi uno scolorimento giallastro, a volte più scuro dei denti e delle otturazioni è stato comunemente osservato dopo un uso a lungo termine. Quest'effetto è ampiamente evitabile pulendo a fondo i denti con un dentifricio ad azione pulente prima dell'uso di Dentohexin soluzione. In casi eccezionali è necessario ricorrere alla pulizia di uno specialista.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

disturbi della percezione del gusto oppure un senso di parestesia della lingua

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Raramente si manifestano reazioni di ipersensibilità (gengive arrossate e dolenti, reazioni allergiche della pelle, delle mucose e degli organi respiratori) (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dentohexin 0,2%?»).

In casi isolati sono state descritte anche gravi reazioni allergiche dopo l'utilizzo locale di clorexidina.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il dentista, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Dentohexin 0,2%?

1 ml di concentrato per soluzione per mucosa orale contenente

Principi attivi

2 mg di clorexidina digluconato

Sostanze ausiliarie

Glicerolo (85%), polisorbato 20, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di rosa, olio essenziale di cinnamomo, olio essenziale di anice, E 127 (eritrosina), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

50174 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Dentohexin 0,2%? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.



Soluzione (con misurino) da 100 ml, 200 ml e 1000 ml..

Titolare dell'omologazione

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

