

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste). Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Diosmin Hesperidine Provectis® 500 mg

Provectis Healthcare AG

Qu'est-ce que Diosmin Hesperidine Provectis et quand doit-il être utilisé?

Diosmin Hesperidine Provectis contient des substances ayant des propriétés toniques et protectrices, bénéfiques dans le traitement des diverses affections des vaisseaux sanguins.

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg comprimé pelliculé est utilisé dans le traitement des troubles de la circulation sanguine veineuse et des oedèmes et dans le traitement de la maladie hémorroïdaire.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Veuillez suivre les recommandations de votre médecin, non seulement au sujet de la prescription mais également ses conseils, comme la gymnastique ou le port de bas de contention (bas à varices).

Quand Diosmin Hesperidine Provectis ne doit-il pas être utilisé?

Hypersensibilité (allergie) soupçonnée ou connue à la fraction flavonoïque ou à l'un des excipients de Diosmin Hesperidine Provectis ou à d'autres flavonoïdes.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Diosmin Hesperidine Provectis?

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste) si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Diosmin Hesperidine Provectis peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation du médicament pendant la grossesse.

En absence des données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste) avant de prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous planifiez d'avoir un enfant.

Comment utiliser Diosmin Hesperidine Provectis?



Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg comprimés pelliculés:

Adultes: La posologie habituelle est de 2 comprimés par jour (soit 1 comprimé à midi et 1 comprimé le soir) à prendre avant, pendant ou après le repas avec un verre d'eau.

Le comprimé ne peut être divisé que le long de la ligne de sécabilité pour faciliter sa prise, mais pas pour le diviser en doses égales.

L'heure et la nature des repas n'ont pas d'influence sur l'efficacité.

L'utilisation et la sécurité d'emploi de Diosmin Hesperidine Provectis n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Si vous avez pris plus de Diosmin Hesperidine Provectis qu'il ne fallait, veuillez contacter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. L'expérience de surdosages avec Diosmin Hesperidine Provectis est limitée. Les symptômes le plus souvent reportés en cas de surdosage incluent diarrhées, nausées, douleurs abdominales, démangeaisons et éruptions cutanées.

Quels effets secondaires Diosmin Hesperidine Provectis peut-il provoquer?

La prise de Diosmin Hesperidine Provectis peut provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Par ordre décroissant de fréquence, les effets secondaires peuvent inclure:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Diarrhée, indigestion, nausée, vomissement.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Colite.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Sensations vertigineuses, maux de tête, malaise, rash, prurit, urticaire.

Cas isolés

Douleur abdominale, oedème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, oedème de Quincke.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste). Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas conserver au-dessus de 30°C. Tenir hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien (ou votre droguiste), qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Diosmin Hesperidine Provectis?

Principes actifs

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg

1 comprimé pelliculé contient: Fraction flavonoïque purifiée, micronisée 500 mg comprenant 450 mg de diosmine et 50 mg de flavonoïdes exprimés en hespéridine.

Excipients



Carboxyméthylamidon sodique (Type A), cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, dodécylsulfate de sodium, glycérol, hypromellose, macrogol 6000, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), dioxyde de titane (E171).

Numéro d'autorisation

70162 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Diosmin Hesperidine Provectis ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg comprimé pelliculé:

Boîte de 30 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées.

Boîte de 60 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées.

Boîte de 120 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées.

Titulaire de l'autorisation

Provectis Healthcare AG, Basel.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

