

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Diosmin Hesperidine Provectis® 500 mg

Provectis Healthcare AG

Che cos'è Diosmin Hesperidine Provectis e quando si usa?

Diosmin Hesperidine Provectis contiene sostanze con proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni.

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg compresse rivestite con film è usato nel trattamento delle turbe della circolazione sanguigna venosa e degli edemi, e nel trattamento della malattia emorroidaria.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

A questo proposito, segua le raccomandazioni del medico, non solo in merito alla prescrizione, ma anche riguardanti eventuale ginnastica da eseguire e l'uso di calze elastiche (calze da varici).

Quando non si può usare Diosmin Hesperidine Provectis?

Ipersensibilità (allergia) sospettata o nota alla frazione flavonoica, a uno degli eccipienti di Diosmin Hesperidine Provectis o ad altri flavonoidi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Diosmin Hesperidine Provectis?

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente senza sodio.

Informi il suo medico o il suo farmacista (o il suo droghiere), nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Diosmin Hesperidine Provectis durante la gravidanza o l'allattamento?

Come misura precauzionale, è meglio evitare l'uso del medicamento durante la gravidanza.

In assenza di dati sul passaggio nel latte materno l'allattamento non è raccomandato durante il periodo di trattamento.

Chiedete consiglio al vostro medico o al farmacista prima di prendere questo medicamento se siete incinta o in allattamento, se pensate di essere incinta o se avete intenzione di avere un bambino.

Come usare Diosmin Hesperidine Provectis?

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg compresse rivestite con film:

Adulti: la posologia usuale è di 2 compresse al giorno (ossia 1 a mezzogiorno e 1 la sera), prima, durante o dopo il pasto, con un bicchiere d'acqua.

La compressa deve essere divisa solo lungo la linea di frattura per la divisione per facilitare l'assunzione, ma non per suddividerla in dosi uguali.

L'ora e la natura dei pasti non hanno influenza sull'efficacia del medicamento.



L'uso e la sicurezza di Diosmin Hesperidine Provectis nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se avesse assunto una dose maggiore del dovuto di Diosmin Hesperidine Provectis, voglia prendere contatto immediatamente con il suo medico o il suo farmacista. L'esperienza di sovradosaggio con Diosmin Hesperidine Provectis è limitata. I sintomi di overdose più comunemente riportati includono diarrea, nausea, dolore addominale, prurito ed eruzione cutanea.

Quali effetti collaterali può avere Diosmin Hesperidine Provectis?

L'assunzione di Diosmin Hesperidine Provectis può causare degli effetti collaterali, i quali, tuttavia, non si riscontrano necessariamente in ciascun caso. In ordine decrescente di frequenza si notano i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Diarrea, indigestione, nausea e vomito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Colite.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Vertigini, mal di testa, malessere, eruzione cutanea, prurito, orticaria.

Singoli casi

Dolori addominali, edemi localizzati del volto, delle palpebre, delle labbra.

Eccezionalmente: edema di Quincke.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista (o droghiere), soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare nella confezione originale. Non conservare a oltre 30°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista (o il droghiere), che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Diosmin Hesperidine Provectis?

Principi attivi

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg

1 compressa rivestita con film contiene: frazione flavonoica purificata, micronizzata 500 mg, costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi in esperidina.

Sostanze ausiliarie

amido carbossimetilato sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, gelatina, stearato di magnesio, talco, Sodio dodecil solfato, glicerolo, ipromellosa, Macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio (E171).

Numero dell'omologazione

70162 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Diosmin Hesperidine Provectis? Quali confezioni sono disponibili?



In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Diosmin Hesperidine Provectis 500 mg compresse rivestite con film:

Scatola da 30 compresse rivestite con film in blister.

Scatola da 60 compresse rivestite con film in blister.

Scatola da 120 compresse rivestite con film in blister.

Titolare dell'omologazione

Provectis Healthcare AG, Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

