

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sensicutan® Crema

Biomed AG

Che cos'è Sensicutan e quando si usa?

Sensicutan crema contiene i due principi attivi levomenolo ed eparina sodica. Sensicutan esercita un effetto antinfiammatorio, antiallergico e antipruriginoso.

Sensicutan viene impiegato nei bambini da 3 anni di età, negli adolescenti e negli adulti per il trattamento delle malattie cutanee infiammatorie, non infettive, fortemente pruriginose e allergiche quali per es.:

- eruzioni cutanee acute e croniche (eczemi)
- dermatiti, per es. neurodermite (dermatite atopica)

Sensicutan è indicato per l'uso in condizioni di cute secca, normale e grassa.

Quando non si può usare Sensicutan?

Sensicutan non deve essere usato in caso di ipersensibilità a levomenolo, eparina, acido sorbico, acido salicilico o a una qualsiasi delle altre sostanze indicate nella composizione.

In caso di predisposizione emorragica e in presenza di un basso numero di trombociti nel sangue si dovrebbe rinunciare all'uso di preparati a base di eparina.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Sensicutan?

Nelle donne in gravidanza e nei bambini va evitata l'applicazione su superfici estese per lunghi periodi di tempo.

Non usare in bambini di età inferiore a 3 anni.

Sensicutan deve essere applicato esclusivamente su cute integra. Non applichi Sensicutan su ferite aperte o sulle mucose.

Se si manifesta una reazione allergica, si deve interrompere immediatamente l'uso di Sensicutan.

Se usa eparina anche sotto un'altra forma, ne parli con il suo medico prima di usare Sensicutan.

Sensicutan contiene acido sorbico, alcol cetilico e alcool stearilico, che possono causare reazioni cutanee localmente circoscritte (per es. dermatite da contatto).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare Sensicutan durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono disponibili studi sufficienti sull'uso di Sensicutan durante la gravidanza e l'allattamento.

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Sensicutan?

Adulti e bambini da 3 anni di età: applicare 2 volte al giorno sulle aree di cute colpite.



La durata d'uso non dovrebbe superare le 8 settimane.

Nei bambini non va usato per periodi prolungati su superfici estese.

Se dopo 1-2 settimane non osserva alcun miglioramento o nota addirittura un peggioramento, si rivolga al suo medico.

L'uso e la sicurezza di Sensicutan nei bambini sotto i 3 anni finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Sensicutan?

In casi molto rari possono manifestarsi intollerabilità cutanee o reazioni allergiche (eruzione cutanea, eritema cutaneo, prurito o bruciore cutaneo). In generale, queste manifestazioni cutanee si attenuano di nuovo dopo interruzione del trattamento. Al manifestarsi di una reazione allergica ci si deve rivolgere al medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservi il tubo sempre ermeticamente chiuso, a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis/A utiliser avant» sul contenitore.

Stabilità dopo apertura: 6 mesi.

Per la prima apertura perforare la membrana di chiusura del tubo con la punta del coperchio.

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sensicutan?

1 g di crema contiene i seguenti componenti farmacologicamente attivi: levomenolo (= α -[–]-bisabololo) 3 mg ed eparina sodica 200 U.I.

Eccipienti

Miscela di alcool cetilico e stearilico, macrogol-cetil-etere, olio di mandorla, trigliceridi a media catena, alcool miristilico, acido citrico, idrolizzato di collagene, α -tocoferolo acetato, dexpantenolo, acido sorbico (E 200), acido salicilico, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

66821 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Sensicutan? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni di crema da 80 g.

Titolare dell'omologazione

Biomed AG, Überlandstrasse 199, CH-8600 Dübendorf.

Fabbricante

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH, D-82547 Eurasburg.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2018 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

