

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

FAKTU, Supposte

Che cos'è Faktu e quando si usa?

Le emorroidi sono di solito accompagnate da sintomi quali dolori, sanguinamenti, secrezioni e prurito. Il policresulene, principale sostanza attiva del Faktu, nelle emorroidi esplica il suo effetto soltanto sul tessuto malato, espellendolo, mentre lascia immutato il tessuto sano. Le superfici interessate vengono coperte, i piccoli vasi sanguigni subiscono una contrazione e si occludono. Con questo le emorragie cessano in breve tempo, secrezione e prurito scompaiono. Inoltre, subentra un incremento della circolazione sanguigna, che accelera il processo di guarigione. La proprietà battericida di Faktu impedisce l'insediamento di germi patogeni e con questo allontana e combatte le infiammazioni. L'anestetico di superficie cincocaina allevia dolori e prurito.

Faktu supposte devono essere usate soltanto su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

E'opportuno provvedere ad andare di corpo regolarmente. Ciò richiede oltre all'assunzione di abbastanza liquidi un'alimentazione variata, ricca di fibre, povera di sostanze grasse difficilmente digeribili e priva di spezie piccanti. Nei disturbi emorroidali l'igiene anale assume particolare importanza. Dopo l'evacuazione l'orifizio anale dovrebbe venir dapprima prudentemente pulito con carta igienica morbida e assorbente ed in seguito sciacquato.

Quando non si può usare Faktu?

Faktu non può essere usato in caso di intolleranza alle sostanze attive policresulene e cincocaina e qualche medicamento per l'insensibilità locale (anestetici di superficie), a meno che il medico lo permetta espressamente.

Faktu contiene lecitina di soia, che può causare reazioni allergiche. Per questo motivo, Faktu non deve essere usato in caso di ipersensibilità alla soia o alle arachidi (allergia crociata).

Faktu non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Faktu?

Quando insorgono sensazioni fastidiose il trattamento va interrotto e si raccomanda di consultare il medico.

Durante il trattamento con Faktu, non utilizzare altri medicinali nello stesso punto.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Faktu durante la gravidanza o l'allattamento?



Non sono disponibili dati clinici sull'utilizzo di Faktu in gravidanza. Pertanto, durante la gravidanza Faktu può essere usato solo su prescrizione medica e solo se assolutamente necessario.

Non è noto se i principi attivi di Faktu passino nel latte materno. Per questo motivo, l'uso di Faktu deve essere evitato durante l'allattamento.

Come usare Faktu supposte?

Adulti: salvo altre prescrizioni introdurre le supposte nell'intestino retto dopo l'evacuazione da 2 a 3 volte al giorno. Una volta migliorati i sintomi il trattamento può venir proseguito con una supposta al giorno.

L'uso e la sicurezza di Faktu nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Faktu non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Faktu?

Con l'applicazione di Faktu possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Occasionalmente insorgono sensazioni fastidiose (ad es. bruciore o prurito) dovute alla sostanza attiva, le quali scompaiono in genere dopo poco tempo.

In casi isolati si possono osservare reazioni allergiche con sensibilizzazione nella zona di contatto (eczema da contatto). Queste possono manifestarsi sotto forma di arrossamento infiammatorio della cute con formazione di vescicole, le quali a loro volta provocano un prurito prolungato. In questi casi il trattamento va interrotto e si raccomanda di consultare il medico.

In casi isolati sono state riportate reazioni allergiche (ad es. gonfiori in viso e in gola, orticaria). In questi casi il trattamento va interrotto e si raccomanda di consultare il medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Possibili modificazioni nella colorazione delle supposte e la comparsa di macchie chiare (maturazione del grasso) sulle supposte sono innocue e non influiscono sull'efficacia.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.



Cosa contiene Faktu?

1 supposte contiene:

Principi attivi

100 mg di policlesulene, 2,5 mg di cincocaina cloridrato

Sostanze ausiliarie

Lecitina di soja (fabbricato di soja geneticamente modificato) e altre sostanze ausiliarie

Numero dell'omologazione

41984 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Faktu? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 10 supposte.

Titolare dell'omologazione

CPS Cito Pharma Services GmbH, 8610 Uster

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

