

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Réactions allergiques des yeux, gouttes pour les yeux (10ml)

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* peut être utilisé en cas de Réactions hypersensibles des muqueuses ophtalmiques ou des paupières telles que: Irritations et brûlures des yeux, par ex. en cas de rhume des foins, Rougeurs, Enflures.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* peut être utilisé simultanément.

En cas d'inflammation des yeux, il n'est pas recommandé de porter des verres de contact. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en passer, retirez-les avant de mettre les gouttes et replacez vos verres de contact au plus tôt 15 minutes après le traitement. L'utilisation est également conseillée le soir, après le retrait des lentilles, avant d'aller se coucher et le matin au réveil, au moins 15 minutes avant de les remettre.

N'oubliez pas qu'un oeil irrité réagira de manière beaucoup plus sensible aux verres de contact.

Si aucune amélioration ne devait intervenir après 2 à 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin.

Si l'état devait même se détériorer ou si de nouveaux symptômes devaient apparaître, p.ex. baisse de l'acuité visuelle, il y aurait lieu de consulter immédiatement un médecin.

Quand *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution ?

- Utiliser uniquement sur prescription médicale chez les enfants de moins de 2 ans.
- Pour les enfants de moins de 2 ans, il existe des gouttes pour les yeux sans agents conservateurs.
- *SIMILASAN réactions allergiques des yeux* ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des excipients employés.
- A utiliser uniquement après un avis médical en cas d'opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome.



Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe) (même en automédication !).

***SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants (à partir de 2 ans) et adultes:

- 1 - 2 gouttes par oeil, une à plusieurs fois par jour.

Ne doit être administré aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.

Application:

- Presser avec deux doigts la partie caoutchouc du bec et faire tomber la goutte dans l'oeil.
- Ne pas toucher la pointe en caoutchouc avec les doigts et éviter le contact avec l'oeil.
- Refermer immédiatement après l'emploi!

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* peut-il provoquer ?

Dans des cas isolés, des réactions d'hypersensibilité telles que brûlures, irritations, rougeurs, démangeaisons et douleurs ont été observées au niveau des yeux lors de l'emploi approprié de *SIMILASAN réactions allergiques des yeux*.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.



La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Une fois le flacon ouvert, la préparation ne devra pas être utilisée pendant plus de 3 mois.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux*?

1 ml de liquide (25 gouttes) contient:

Principes actifs

Apis mellifica (HAB) D6 0.303 ml

Euphrasia 3c (HAB) D6 0.303 ml

Schoenocaulon officinale (HAB) D6 0.303 ml

Excipients

Acide borique; tétraborate de sodium (borax), nitrate de sodium, sulfate d'argent, eau pour préparations injectables.

1 ml correspond à 25 gouttes.

Numéro d'autorisation

45116 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Réactions allergiques des yeux* ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

– Flacon de 10 ml

Titulaire de l'autorisation

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

