

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi, gocce per gli occhi (10 ml)

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi* ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi* può essere usato in caso di Reazioni ipersensibili delle mucose degli occhi e delle palpebre, come: Prurito e bruciore degli occhi, ad es. in caso di raffreddore da fieno; Arrossamenti; Gonfiore.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi*.

Si sconsiglia di portare le lenti a contatto in caso d'infezioni agli occhi. Qualora tuttavia non si possa far a meno delle lenti a contatto, toglierle prima di instillare il collirio e rimettere non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall'istillazione. Si consiglia l'uso anche dopo aver tolto le lenti di sera prima di andare a dormire e di mattina al risveglio, almeno 15 minuti prima di mettere le lenti. Si tenga presente che quando l'occhio è infiammato reagisce alle lenti con maggiore sensibilità. Rivolgersi ad un medico se non si osserva alcun miglioramento apprezzabile nel giro di 2 - 3 giorni.

Consultare immediatamente il medico qualora si noti un peggioramento o la comparsa di nuovi sintomi, per es. una diminuzione dell'acuità visiva.

Quando non si può usare *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

- Per bambini fino ai 2 anni, utilizzare solo su prescrizione medica.
- Per bambini fino ai 2 anni, sono disponibili gocce per gli occhi prive di conservanti.
- *SIMILASAN reazioni allergiche degli occhi* non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota a una delle sostanze ausiliarie utilizzate.
- In caso di offuscamento del cristallino (cataratta) o glaucoma usare soltanto dopo la diagnosi medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può usare *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi* durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi?*

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (sopra i 2 anni) e adulti:

- Da una a più volte il giorno, 1 - 2 gocce in ogni occhio.

Può essere somministrato ai bambini sotto i 2 anni solo su prescrizione medica.

Applicazione:

- Premere con due dita sul beccuccio di gomma e far cadere le gocce negli occhi.
- Non toccare la punta con le dita ed evitare il contatto diretto con l'occhio.
- Chiudere immediatamente la bocchetta dopo l'uso!

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere l'uso del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi?*

In casi isolati, con *SIMILASAN reazioni allergiche degli occhi*, usato correttamente, sono state osservate reazioni di ipersensibilità come bruciore, irritazione, arrossamento, prurito e dolore agli occhi. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Utilizzare il preparato entro 3 mese dall'apertura del flacone.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.



Cosa contiene *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi?*

1 ml di liquido (25 gocce) contiene:

Principi attivi

Apis mellifica (HAB) D6 0.303 ml

Euphrasia 3c (HAB) D6 0.303 ml

Schoenocaulon officinale (HAB) D6 0.303 ml

Sostanze ausiliarie

Acido borico, sodio tetraborato (borace), sodio nitrato, argento solfato, acqua per preparazioni iniettabili.

1 ml corrisponde a 25 gocce.

Numero dell'omologazione

45116 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Reazioni allergiche degli occhi?* Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

– Flacone da 10 ml

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

