

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

metavirulent®, Gocce orali

Medicamento omeopatico

Quando si usa metavirulent®?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici metavirulent® può essere usato in caso di fenomeni influenzali, raffreddori accompagnati da febbre e rinofaringite acuta.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere metavirulent®. Per prevenire comuni raffreddori si consiglia di consultare un medico ai seguenti soggetti:

- ultrasessantenni,
- adulti e bambini ad alto rischio di complicanze influenzali in presenza delle seguenti condizioni sfavorevoli:
 - cardiopatie croniche,
 - broncopatie croniche (bronchite cronica, asma, mucoviscidosi ecc.),
 - nefropatie croniche,
 - malattie metaboliche (ad es. diabete),
- persone affette da immunodeficienza,
- persone che per lavoro sono sottoposte ad un elevato rischio di infezione (ad es. operatori sanitari).

Quando non si può usare metavirulent® e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Questo medicamento contiene 240 mg di alcol (etanolo) in ogni 30 gocce che è equivalente a 296 mg/ml (37% Vol.). La quantità in 30 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 6 ml di birra o 3 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

In caso di febbre alta o peggioramento è opportuno consultare prematuramente il medico, in particolare se tali condizioni colpiscono dei bambini. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il farmaco deve quindi essere assunto solo dopo aver consultato il medico, il farmacista o il droghiere.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).



Si può assumere usare metavirulent® durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare metavirulent®?

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

La posologia per gli adulti è:

- in profilassi e quando si avvertono i primi sintomi di un raffreddore, come ad esempio degli starnuti: 20–30 gocce 1–3 volte al giorno,
- in fase acuta: 10–20 gocce ogni ora,
- per i bambini da 2 anni, somministrare altrettante gocce quanti sono gli anni, sempre diluite in acqua.

Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il farmaco deve quindi essere assunto solo dopo aver consultato il medico, farmacista o droghiere.

Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere metavirulent®?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con metavirulent® e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di metavirulent®.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Termine di consumo dopo l'apertura

Si conserva per 12 mesi dall'apertura.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene metavirulent®?

1 g di liquido contiene:

Principi attivi



Acidum L(+)-lacticum (Acidum (S)-lacticum Ph. Eur.) D15 (HAB 5a) 30 mg, Aconitum napellus (HAB) D4 20 mg, Ferrum phosphoricum (HAB) D8 500 mg, Gelsemium sempervirens (HAB) D4 30 mg, Influenzinum viri A et/aut B ex humanum sputum D30 (HAB 44) 100 mg, Veratrum album (HAB) D4 200 mg.

Sostanze ausiliarie

Etanolo, lattosio monoidrato e acqua purificata

Contiene il 37% di alcol in volume.

1 g di liquido corrisponde a 39 gocce o 1,05 ml.

Numero dell'omologazione

44508 (Swissmedic)

Dove è ottenibile metavirulent®? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone da 50 ml e 100 ml.

Titolare dell'omologazione

metapharmaka GmbH, 6462 Seedorf

Indirizzo postale: metapharmaka GmbH, Oberer Baumgarten 9, 6466 Bauen

Fabbricante

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

