

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Oscillococcinum[®], globules

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Oscillococcinum est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Oscillococcinum peut être utilisé en cas de traitement préventif de la grippe, d'état grippal à son début et d'état grippal déclaré.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Oscillococcinum peut être pris simultanément.

En cas de fièvre élevée ou en cas d'aggravation de l'état général, consultez rapidement le médecin, en particulier chez les enfants. En règle générale, chez les enfants en-dessous de 2 ans, l'apparition d'une fièvre subite élevée ou une élévation progressive de la fièvre doit faire l'objet d'une consultation médicale. Pour la prévention d'infections grippales, il est recommandé de consulter le médecin en particulier:

- Chez les personnes de plus de 60 ans,
- Chez les adultes et enfants présentant un risque élevé de complication lors de gripes en cas d'affections comme: affections cardiaques chroniques, maladies pulmonaires chroniques (bronchite chronique, asthme, mucoviscidose, etc.), maladies des reins chroniques, maladies du métabolisme (p.ex.: le diabète),
- Chez les personnes atteintes de déficience immunitaire,
- Chez les personnes exerçant une profession à risque élevé de contagion (p.ex.: personnel médical).

Quand Oscillococcinum ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Oscillococcinum peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Oscillococcinum?



Sauf prescription contraire du médecin:

Prévention: 1 dose globules par semaine pendant la période d'exposition grippale.

État grippal à son début: 1 dose globules le plus tôt possible dès les premiers symptômes de l'état grippal. Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle.

État grippal déclaré: 1 dose globules matin et soir pendant 1 à 3 jours.

Laisser fondre sous la langue le contenu de la dose. Prendre Oscillococcinum à distance des repas, 1/4 d'heure avant ou 1 heure après.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Oscillococcinum peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Oscillococcinum et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Oscillococcinum n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Oscillococcinum?

Principes actifs

1 dose contient 1 g de globules de Anas Barbariae, Hepatis et Cordis extractum 200 K.

Excipients

Cette préparation contient en outre des excipients: saccharose et lactose.

Numéro d'autorisation

52862 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Oscillococcinum? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 6 ou 30 doses.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA – France



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2003 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

