

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Assan® Emgel/Gel

Permamed AG

Qu'est-ce que Assan emgel/gel et quand doit-il être utilisé?

Assan combat l'inflammation, apaise la douleur et accélère la résorption des œdèmes (enflures).

Il ne tache pas et ne graisse pas. Assan gel contient de l'alcool et a en outre un effet rafraîchissant et apaisant.

Assan est utilisé dans

les affections rhumatismales aiguës et chroniques,

les affections douloureuses et inflammatoires de l'appareil locomoteur et de soutien, des muscles, tendons, ligaments, articulations, de la colonne vertébrale, y compris des disques intervertébraux,

les lésions contuses telles que meurtrissures, entorses et claquages,

les affections veineuses des jambes.

Quand Assan emgel/gel ne doit-il pas être utilisé?

Assan ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des principes actifs ou des excipients, ni en cas d'hypersensibilité à d'autres substances antalgiques et anti-inflammatoires.

De plus, il ne doit pas être appliqué sur de grandes surfaces et de manière prolongée chez les patients atteints d'une affection rénale. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, les plaies ouvertes ou une peau lésée.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Assan emgel/gel?

Aucune précaution n'est à prendre si le médicament est utilisé conformément aux prescriptions. Assan gel contient 85 mg de propylène glycol pour 1 g de gel. Assan gel contient 365 mg d'alcool pour 1 g de gel. Une sensation de brûlure peut apparaître en cas de lésions cutanées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous avez déjà fait des réactions allergiques à des médicaments similaires (pommades contre les rhumatismes),
- vous souffrez d'autres maladies,
- vous êtes allergique ou
- vous utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Assan emgel/gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

En principe, Assan ne doit pas être utilisé sans autorisation médicale pendant la grossesse et la période d'allaitement.

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et la période d'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Assan emgel/gel?

Adultes:



Sauf prescription contraire, appliquer 2 à 3 fois par jour un ruban de 5 à 10 cm sur les endroits à traiter et sur la peau avoisinante. Faire pénétrer en massant. L'endroit à traiter doit être exempt de résidus d'autres médicaments et de produits cosmétiques. Il est recommandé de se laver les mains après chaque application.

L'utilisation et la sécurité d'Assan emgel/gel n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Assan emgel/gel peut-il provoquer?

L'utilisation d'Assan emgel/gel peut avoir les effets secondaires suivants:

Dans de rares cas, Assan peut provoquer des irritations de la peau, p.ex. des rougeurs, qui en général régressent spontanément après l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant sur le récipient après la mention «EXP».

Remarques particulières concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Autres remarques

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Assan emgel/gel?

Principes actifs

1 g d'Assan emgel contient comme principes actifs 35 mg d'acide flufénamique, 100 mg de salicylate d'hydroxyéthyle et 300 U.I. d'héparine sodique.

1 g d'Assan gel contient comme principes actifs 35 mg d'acide flufénamique, 50 mg de salicylate d'hydroxyéthyle et 300 U.I. d'héparine sodique.

Excipients

Assan emgel contient les excipients suivants: carbomère 980, stéarate de glycéryle, PEG-100 stéarate, PEG-2 stéarate, huile de paraffine, huile de romarin, pentadécalactone, édétate sodique, sesquistéarate de méthylglucose, PEG-20 sesquistéarate de méthylglucose, diméticone, palmitate d'isopropyle, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Assan gel contient les excipients suivant: éthanol 96 % 365 mg/g, propylène glycol (E1520) 85 mg/g, aminométhyl propanol, hydroxyméthylcellulose, huile de romarin, édétate sodique, adipate de diisopropyle, polysorbate 20, éther monoéthylique du diéthylène glycol, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

55608, 45443 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Assan emgel/gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.



Assan emgel: tubes de 50 g et 100 g.

Assan gel: tubes de 50 g et 100 g.

Titulaire de l'autorisation

Permamed SA, 4143 Dornach.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

