

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cralonin, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique

Quand Cralonin est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Cralonin peut être utilisé en cas de troubles fonctionnels du coeur et de la circulation.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'application indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Cralonin peut être pris simultanément. Lors de troubles tels que un pouls irrégulier, de fortes palpitations, des douleurs poignantes dans la poitrine, une dyspnée (difficulté à respirer) d'apparition soudaine ou se prolongeant, il faut consulter un médecin. Celui-ci constatera si le coeur ou les vaisseaux sont atteints du point de vue organique ou si ces troubles sont d'origine nerveuse.

Quand Cralonin ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

Si vous souffrez d'une maladie cardiaque connue, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. Si vous ressentez un essoufflement ou des douleurs dans la région cardiaque qui peuvent irradier dans les bras, la partie supérieure de l'abdomen ou la gorge, il est urgent de consulter un médecin. En cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.

Ce médicament contient 355 mg d'alcool (éthanol) en 20 gouttes (35,5% p/v). La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 9 ml de bière ou 4 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable. Cralonin n'a aucune influence ou une influence négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Cralonin ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste, si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Cralonin peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments



durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Cralonin?

Sauf prescription contraire du médecin, pour un traitement à long terme chez les adultes, avaler 20 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, commencer par 10 gouttes toutes les 15 minutes, jusqu'à 12 fois par jour. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste. Ne pas administrer chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans.

Quels effets secondaires Cralonin peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Cralonin et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste. Aucun effet secondaire de Cralonin n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Au cours du stockage, on peut observer de légères floculations qui toutefois n'exercent aucune influence sur la qualité du remède. Dans ces cas, bien agiter le produit avant l'emploi

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Cralonin?

1 g de liquid (= 21 gouttes) contient:

Principes actifs

Crataegus (HAB) MT 0,7 g

Kalium carbonicum (HAB) D3 (HAB 5a) 0,01 g

Spigelia anthelmia (HAB) D2 0,01 g

Excipients

éthanol, eau purifiée

Contient 45% de vol d'éthanol

Numéro d'autorisation



37969 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Cralonin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 ml et 100 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Historique des révisions

