

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Adabencutan Forte Gel

Dermapharm AG

Qu'est-ce que Adabencutan Forte Gel et quand doit-il être utilisé?

Adabencutan Forte gel est utilisé pour le traitement de l'acné modérée, lorsque des comédons (points noirs, points blancs) et de nombreuses papules et pustules (boutons inflammatoires) sont présents. Il contient deux principes actifs, l'adapalène et le peroxyde de benzoyle, qui agissent de façons différentes.

- L'adapalène est un rétinoïde, il agit spécifiquement sur la peau, sur divers processus qui causent l'acné.
- Le peroxyde de benzoyle agit comme un agent antimicrobien. Il a également une action adoucissante et exfoliante sur la couche supérieure cutanée, une action qui s'avère bénéfique dans le traitement de l'acné.

Adabencutan Forte ne doit être utilisé que chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans.

Quand Adabencutan Forte ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser Adabencutan Forte

- si vous souffrez d'une hypersensibilité connue (allergie) à l'adapalène, au peroxyde de benzoyle ou à tout autre composant d'Adabencutan Forte
- si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse
- sur une peau présentant des coupures, des éraflures ou des coups de soleil
- sur une peau eczémateuse
- chez les enfants de moins de 12 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Adabencutan Forte?

Appliqué sur le visage, Adabencutan Forte ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses (dans les yeux, le nez ou la bouche); le contact avec les autres zones très sensibles du corps doit également être évité. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède.

Pendant l'application d'Adabencutan Forte, vous devez éviter de traiter de manière concomitante l'acné avec d'autres préparations contenant du peroxyde de benzoyle et/ou des rétinoïdes.

Évitez une exposition excessive au soleil ou aux lampes à ultraviolets.

Évitez l'utilisation concomitante de produits cosmétiques irritants, desséchants ou astringents.

Si vous ressentez une irritation cutanée pendant l'utilisation d'Adabencutan Forte, contactez votre médecin (voir «Comment utiliser Adabencutan Forte?»).

Les femmes en âge de procréer ne doivent utiliser Adabencutan Forte qu'en association avec une méthode de contraception sûre (voir «Adabencutan Forte peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Adabencutan Forte contient du propylène glycol (E 1520), cet ingrédient peut provoquer une irritation de la peau.

Adabencutan Forte ne doit pas entrer en contact avec des matériaux colorés, notamment les cheveux ou les textiles colorés, en raison du risque de blanchiment ou de décoloration.



Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Adabencutan Forte peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Adabencutan Forte ne doit pas être utilisé durant la grossesse. Si une grossesse est envisagée, Adabencutan Forte ne doit pas non plus être utilisé. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser un contraceptif approprié pendant le traitement et jusqu'à un mois après la fin du traitement. Parlez à votre médecin de la méthode que vous désirez utiliser.

Si vous tombez enceinte au cours du traitement par Adabencutan Forte, interrompez immédiatement le traitement et informez-en votre médecin dès que possible pour mettre en place un nouveau traitement.

Adabencutan Forte ne doit pas être utilisé pendant la période d'allaitement.

Comment utiliser Adabencutan Forte?

Adabencutan Forte doit toujours être utilisé selon les indications du médecin. Si vous avez des questions au sujet de ce traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Le médecin décidera du niveau de concentration d'Adabencutan dont vous avez besoin en fonction de la sévérité de votre acné et de son apparence.

La peau doit être propre et sèche avant l'application.

Appliquez une fine couche de gel de façon homogène sur l'ensemble de la zone affectée par l'acné, une fois par jour avant le coucher, en évitant les yeux, les lèvres et les narines. Lavez-vous les mains soigneusement après application.

Une application plus fréquente ou l'utilisation de plus grandes quantités d'Adabencutan Forte n'apporte pas de meilleurs résultats, mais peut provoquer irritations et rougeurs cutanées.

Si vous oubliez d'utiliser Adabencutan Forte, vous ne devez pas utiliser de double quantité pour compenser.

Votre médecin saura vous indiquer pendant combien de temps vous devez utiliser Adabencutan Forte. Si vous ne voyez pas d'amélioration après 4 à 8 semaines, discutez avec votre médecin de l'intérêt de continuer à utiliser Adabencutan Forte.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Si vous ressentez une irritation de la peau lors de l'application d'Adabencutan Forte, parlez-en à votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'appliquer une crème hydratante non comédogène et d'espacer les applications de gel voire de suspendre le traitement pendant une courte période ou de l'arrêter complètement.

Contactez votre médecin si le médicament a été pris par erreur.

N'appliquez pas de produits cosmétiques (tels que des crèmes pour le visage ou du maquillage) avant d'utiliser Adabencutan Forte. Ces produits peuvent être utilisés dès que le gel appliqué est sec.

Quels effets secondaires Adabencutan Forte peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- Irritation cutanée
- Eczéma
- Sensation de brûlure sur la peau
- Rougeur de la peau



- Desquamation de la peau

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

- Rougeur de la paupière
- Picotements et sensations d'aiguilles à l'endroit où le gel a été appliqué
- Démangeaisons
- Éruption cutanée
- Peau sèche

Les irritations cutanées consécutives à l'utilisation d'Adabencutan Forte sont généralement légères à modérées, avec des signes locaux (rougeurs, peau sèche, desquamation de la peau, brûlures cutanées et douleurs cutanées). Ces effets indésirables surviennent surtout pendant les premiers jours de traitement et diminuent généralement progressivement au cours de la poursuite du traitement. Parlez-en à votre médecin si vous présentez de telles irritations de la peau (voir «Comment utiliser Adabencutan Forte?»).

En plus des effets indésirables décrits ci-dessus, les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Adabencutan gel (adapalène 0,1 %/peroxyde de benzoyl 2,5 %):

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

- Brûlure de type coup de soleil

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

- gonflement de la paupière, sensation de gorge serrée, réaction allergique locale, vésicules, douleurs cutanées, gonflement du visage, difficulté à respirer, décoloration de la peau, rougeur ou démangeaisons, réactions allergiques sévères pouvant être associées à une gêne respiratoire ou à des étourdissements, ainsi que brûlures au site d'application.

Les brûlures au site d'application sont en général superficielles, mais des cas plus graves avec formation de cloques ont été signalés.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Adabencutan Forte a une durée de conservation de 3 mois après ouverture de l'emballage.

Remarque concernant le stockage

Conserver dans l'emballage d'origine une température ne dépassant pas 30 °C et hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Adabencutan Forte?

Adabencutan Forte est un gel opaque de couleur blanche à jaune très pâle.

1 g de gel Adabencutan Forte contient

Principes actifs

3 mg d'adapalène et 25 mg de peroxyde de benzoyl.



Excipients

Copolymère d'acrylamide et d'acryloyldiméthyltaurate de sodium, isohexadécane, polysorbate 80, oléate de sorbitan, docusate de sodium, édétate disodique, glycérol (E 422), poloxamère 124, propylène glycol (E 1520), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

70282 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Adabencutan Gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Récipients multidoses avec système de pompe contenant 15 g, 30 g, 45 g et 60 g de gel.

Titulaire de l'autorisation

Dermapharm AG, Hünenberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

