

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

BELASONE LEMAN

Che cos'è BELASONE LEMAN e quando si usa?

Il principio attivo principale di Belasone Lemman (betametasone dipropionato) ha un'azione antinfiammatoria, antiallergica e antipruriginosa. Inoltre, Belasone Lemman contiene un principio attivo (acido salicilico) che favorisce la penetrazione del betametasone dipropionato attraverso la pelle, ha un effetto squamolitico e riduce l'eccessiva cheratinizzazione della pelle.

Belasone Lemman è indicato per il trattamento di affezioni infiammatorie della pelle che tendono a manifestare ipercheratosi, come per es. gli eczemi persistenti di diversa origine e la psoriasi.

Belasone Lemman è da utilizzare solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare BELASONE LEMAN?

Non utilizzi Belasone Lemman se soffre di ipersensibilità ai salicilati o ad un'altra componente del preparato, in caso di varicella, infezione da herpes (per es. Febbre labiale), tubercolosi e sifilide cutanee, reazioni vaccinali, dermatite periorale (infiammazioni nella regione della bocca) e rosacea.

Non utilizzi Belasone Lemman in caso di ferite aperte e infiammazioni purulente come per es. foruncoli, ascessi e acne.

Belasone Lemman non è indicato per il trattamento degli occhi. Belasone Lemman non devono essere utilizzati nemmeno in prossimità degli occhi.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di BELASONE LEMAN?

Belasone Lemman è un medicamento molto efficace. Non prolunghi la durata del trattamento prescritta dal medico, che varia normalmente da 2 a 3 settimane, in quanto potrebbero manifestarsi delle lesioni cutanee. Se un'affezione cutanea non risponde al trattamento entro alcuni giorni o magari peggiora, consulti il suo medico. Gli comunichi anche se dovessero manifestarsi prurito e arrossamento, vescicole o un forte assottigliamento e lesioni della pelle.

Se i sintomi ricompaiono entro 2 settimane dalla fine del trattamento, non usi l'unguento senza aver prima consultato un medico, a meno che il suo medico non l'abbia istruita a farlo. Se i sintomi ricompaiono dopo che si erano risolti, consulti un medico prima di ripetere il trattamento se l'arrossamento si estende oltre l'area originariamente trattata ed è presente bruciore.

È da evitare l'uso su un'estesa superficie cutanea (più del 10% della superficie corporea) e su regioni della pelle con una elevata capacità di assorbimento (ferite aperte, pelle lesa, zone intertriginose [pieghe cutanee] delle articolazioni e fra le dita delle mani o dei piedi, in prossimità delle mucose e attorno agli occhi).

Riferisca al suo medico se si manifestano visione annebbiata o disturbi visivi. Il suo medico deciderà se bisogna rivolgersi a un oculista, per accertare le possibili cause (tra cui opacizzazione del cristallino, glaucoma o altre malattie rare) dei suoi disturbi della vista.



Se soffre di un'infezione batterica o micotica della cute, oppure se un'infezione del genere si manifesta durante il trattamento, il medico deve prescrivere un trattamento aggiuntivo con antibiotici o antimicotici. Nei bambini Belasone Leman è da usare con prudenza, per periodi brevi e su piccole superfici. Interrompere temporaneamente il trattamento, se Belasone Leman dovesse causare una forte disidratazione della pelle o squame indesiderate.

Utilizzi Belasone Leman solo per l'attuale affezione cutanea per la quale il medico le ha prescritto il medicamento, e non lo utilizzi per eventuali affezioni cutanee future. Non lo dia ad altre persone.

Informi il suo medico o farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare BELASONE LEMAN durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, se vuole iniziare una gravidanza o se allatta, deve fare uso di Belasone Leman solo dopo aver consultato il medico.

Il medico deciderà se potrà utilizzare Belasone Leman durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare BELASONE LEMAN?

Se il medico non prescrive diversamente, segua le istruzioni seguenti.

Applicare 2 volte al giorno (mattina e sera) uno strato sottile sulle parti ammalate della pelle e massaggiare leggermente.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere BELASONE LEMAN?

Durante l'uso di Belasone Leman possono comparire i seguenti effetti collaterali:

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

All'inizio del trattamento

Irritazioni, bruciore, prurito, secchezza, ipersensibilità.

Durante il trattamento per lunghi periodi di tempo

Assottigliamento della cute, dilatazione dei vasi sanguigni superficiali, smagliature, sanguinamenti sotto la pelle, acne, rosacea (arrossamento, brufoli e desquamazione della pelle del volto), infiammazioni cutanee attorno alla bocca.

Reazione da sospensione dopo la fine del trattamento: dopo un uso continuato a lungo termine, può comparire una reazione da sospensione dopo la fine del trattamento. Possono comparire uno o più dei seguenti sintomi: arrossamento cutaneo che può estendersi oltre l'area trattata, sensazione di bruciore o di puntura, forte prurito, desquamazione cutanea, vesciche aperte umide.

In seguito all'uso dei corticosteroidi topici, è stata riportata visione annebbiata.

Nell'uso su superfici cutanee estese e/o con medicazioni

Malattie sistemiche quali infezioni, malattie dell'equilibrio ormonale (ridotta funzione delle ghiandole surrenali, aumento della concentrazione di cortisolo), diabete, smagliature, diminuzione e indebolimento del tessuto osseo, ritardo della crescita nei bambini, ritenzione idrica.

Occorre considerare che nei bambini, in particolare nei lattanti e nei bambini piccoli, i principi attivi vengono assorbiti in quantità maggiore nella circolazione sanguigna e ne possono conseguire disturbi della crescita in caso di uso prolungato.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.



Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Durata di conservazione dopo l'apertura

Belasone Leman ha una durata di conservazione di 6 mesi dopo l'apertura, se conservato a una temperatura inferiore a 25°C.

Istruzioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare Belasone Leman a temperatura ambiente (15-25 °C).

Altre indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene BELASONE LEMAN?

Unguento bianco, semitrasparente e omogeneo.

1 g di unguento contiene:

Principi attivi

0,5 mg di betametasone (sotto forma di 0,64 mg di betametasone dipropionato), 30 mg di acido salicilico.

Sostanze ausiliarie

Paraffina liquida, vaselina bianca.

Numero dell'omologazione

69373 (Swissmedic).

Dove è ottenibile BELASONE LEMAN? Quali confezioni sono disponibili?

Belasone Leman è ottenibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Tubi da 30 g.

Titolare dell'omologazione

Leman SKL SA, Lancy.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

