

---

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie Nebenwirkungen melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Kapitel «Welche Nebenwirkungen kann Dawnzera haben?».

### **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel anwenden.

Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden. Geben Sie es nicht an andere Personen weiter. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **Dawnzera 80 mg Injektionslösung im Fertigpen**

### **Was ist Dawnzera und wann wird es angewendet?**

Dawnzera enthält den Wirkstoff Donidalorsen.

Dawnzera ist ein Arzneimittel, das zur Vorbeugung von Angioödem-Attacken bei Personen ab 12 Jahren mit hereditärem Angioödem (HAE) eingesetzt wird.

HAE ist eine Erkrankung, die in der Familie vererbt wird. Bei dieser Erkrankung enthält Ihr Blut zu wenig von einem Protein (Eiweissstoff) namens C1-Inhibitor, oder dieses Protein funktioniert nicht richtig. Dies führt dazu, dass zu viel des Enzyms Plasmakallikrein vorhanden ist, wodurch wiederum der Bradykininspiegel in Ihrem Blutkreislauf ansteigt. Zu viel Bradykinin führt zu HAE-Symptomen wie Schwellungen und Schmerzen in verschiedenen Teilen Ihres Körpers, darunter:

- Hände und Füße
- Gesicht, Augenlider, Lippen oder Zunge
- Kehlkopf (Larynx), wodurch das Atmen erschwert werden kann
- Genitalien
- Magen und Darm

Dawnzera ist ein Medikament, das als Antisense-Oligonukleotid bezeichnet wird. Es blockiert die Produktion von Plasmakallikrein. Dies trägt dazu bei, die Menge an Bradykinin in Ihrem Blutkreislauf zu verringern, und verhindert die Symptome von HAE.

Dawnzera unterliegt der Verschreibungspflicht durch einen Arzt oder eine Ärztin.

### **Wann darf Dawnzera nicht angewendet werden?**

Dawnzera darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch auf Donidalorsen oder einen der Hilfsstoffe dieses Arzneimittels sind (siehe «Was ist in Dawnzera enthalten?»).

### **Wann ist bei der Anwendung von Dawnzera Vorsicht geboten?**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Dawnzera anwenden.



Dawnzera kann schwerwiegende allergische Reaktionen verursachen (siehe «Welche Nebenwirkungen kann Dawnzera haben?»). Wenn Sie eine schwere allergische Reaktion auf Dawnzera mit Symptomen wie Ausschlag, Schwierigkeiten beim Atmen, Engegefühl in der Brust, Atemgeräusche (Keuchen), Schwellungen im Mundbereich oder schnellem Herzschlag haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal. Behandeln Sie eine Attacke des hereditären Angioödems mit Ihrem herkömmlichen Notfallmedikament, ohne zusätzliche Dosen von Dawnzera anzuwenden.

#### *Kinder und Jugendliche*

Dawnzera wird bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren nicht empfohlen. Das liegt daran, dass es in dieser Altersgruppe nicht untersucht wurde.

#### *Anwendung von Dawnzera zusammen mit anderen Arzneimitteln*

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es ist nicht bekannt, dass Dawnzera andere Arzneimittel beeinflusst oder von anderen Arzneimitteln beeinflusst wird.

#### *Dawnzera enthält Natrium*

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Fertigpen, d. h., es ist nahezu «natriumfrei».

#### *Fahrtüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen*

Dieses Arzneimittel hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen/anwenden.

#### ***Darf Dawnzera während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?***

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin um Rat.

Es liegen nur begrenzte Informationen über die Sicherheit der Anwendung von Dawnzera während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Aus Vorsichtsgründen soll eine Anwendung von Donidalorsen während der Schwangerschaft vermieden werden.

Informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, wenn Sie stillen. Dieses Arzneimittel kann in die Muttermilch übergehen, und es ist nicht bekannt, ob es Ihr Kind beeinflussen kann. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird mit Ihnen besprechen, ob Sie die Behandlung mit diesem Arzneimittel unterbrechen sollen, während Sie stillen, oder ob Sie das Stillen einstellen sollen.



Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird mit Ihnen die Risiken und den Nutzen der Anwendung dieses Arzneimittels besprechen.

### ***Wie verwenden Sie Dawnzera?***

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Ihrer Apothekerin an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dawnzera wird als gebrauchsfertige Injektionslösung in Fertigpens zum einmaligen Gebrauch bereitgestellt. Ihre Behandlung wird unter der Aufsicht eines bzw. einer in der Behandlung von HAE-Patienten erfahrenen Arztes bzw. Ärztin begonnen und durchgeführt.

### ***Wie viel ist von Dawnzera anzuwenden***

Die empfohlene Dosis beträgt einen Fertigpen einmal pro Monat. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum keine Attacke hatten, kann Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin die Dosis in einen Pen alle 2 Monate ändern.

### ***Wie wird Dawnzera injiziert***

**Wenn Sie Dawnzera selbst injizieren oder wenn Ihre Betreuungsperson es injiziert, müssen Sie oder Ihre Betreuungsperson die ausführlichen Anweisungen in der Rubrik «Hinweise für den Gebrauch» sorgfältig lesen und befolgen.**

- Dawnzera wird unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion).
- Die Injektion kann bei Personen ab 12 Jahren entweder selbst oder von einer Betreuungsperson durchgeführt werden.
- Bevor Sie Dawnzera zum ersten Mal anwenden, sollte ein Arzt oder Apotheker bzw. eine Ärztin oder Apothekerin oder medizinisches Fachpersonal Ihnen zeigen, wie Sie es richtig vorbereiten und injizieren. Injizieren Sie es sich selbst oder anderen Personen nicht, bevor Sie nicht in der Injektion des Arzneimittels geschult wurden.
- Stechen Sie die Nadel in das Fettgewebe im Bauch, an der Vorderseite des Oberschenkels oder an der Rückseite des Oberarms.
- Injektionen in die Rückseite des Oberarms dürfen nur von Betreuungspersonen durchgeführt werden.
- Injizieren Sie das Arzneimittel jedes Mal an einer anderen Stelle.
- Verwenden Sie jeden Fertigpen von Dawnzera nur einmal.

### ***Wenn Sie eine grössere Menge von Dawnzera angewendet haben, als Sie sollten***

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie eine zu grosse Menge von Dawnzera angewendet haben.

### ***Wenn Sie die Anwendung von Dawnzera vergessen haben***

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Holen Sie die versäumte Injektion so schnell wie möglich nach. Danach ist die Anwendung in der vorgeschriebenen Häufigkeit (einmal monatlich oder einmal alle 2 Monate) ab dem Datum der zuletzt verabreichten Dosis wieder aufzunehmen.

### ***Wenn Sie die Anwendung von Dawnzera abbrechen***



Es ist wichtig, dass Sie Dawnzera weiterhin nach Anweisung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin injizieren, auch wenn Sie sich besser fühlen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

### **Welche Nebenwirkungen kann Dawnzera haben?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eine schwere allergische Reaktion auf Dawnzera mit Symptomen wie Ausschlag, Schwierigkeiten beim Atmen, Engegefühl in der Brust, Atemgeräuschen (Keuchen), Schwellungen im Mundbereich oder schnellem Herzschlag haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken:

*Sehr häufig (betrifft mehr als einen von 10 Behandelten):*

Reaktionen an der Injektionsstelle mit Symptomen wie Rötungen, Veränderungen der Hautfarbe, Schmerzen, Juckreiz, Verhärtungen, Hämatome (Blutung unter der Haut an der Injektionsstelle), blaue Flecken, Abschuppung der Haut, allergische Reaktionen und Schwellungen.

*Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Behandelten):*

Allergische Reaktionen (einschliesslich schwerwiegende lebensbedrohliche allergische Reaktionen). Folgende Anzeichen können auftreten: Ausschläge (Nesselsucht), Schwierigkeiten beim Atmen, Schmerzen in der Brust und Schwellungen im Mundbereich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **Was ist ferner zu beachten?**

#### **Haltbarkeit**

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung (Etikett und Originalverpackung) mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Das Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Der Fertigen kann in der Originalverpackung bei unter 30 °C für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 6 Wochen gelagert werden, jedoch nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus. In diesem Fall ist das Entsorgungsdatum in den dafür vorgesehenen Bereich auf der Originalverpackung einzutragen.

#### **Besondere Lagerungshinweise**



Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). Nicht einfrieren. Nicht Hitze aussetzen. Den Fertigpen in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden, wenn Sie Folgendes bemerken:

- Die durchsichtige Kappe fehlt oder sitzt nicht fest.
- Das Verfalldatum (EXP) bzw. das Entsorgungsdatum ist überschritten.
- Das Arzneimittel ist trüb, verfärbt oder enthält Partikel.
- Der Fertigpen erscheint beschädigt.

### **Entsorgungshinweis**

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten können in Apotheken oder Sammelstellen abgegeben werden. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

### **Was ist in Dawnzera enthalten?**

#### **Wirkstoff:**

Donidalorsen

(ein synthetisch hergestelltes, chemisch modifiziertes Antisense-Oligonukleotid).

Jeder Fertigpen enthält 80 mg Donidalorsen in 0,8 ml Lösung.

#### **Hilfsstoffe:**

Natriumdihydrogenphosphat (E 339), Dinatriumhydrogenphosphat (E 339), Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure (E 507) (zur Einstellung des pH-Werts), Natriumhydroxid (E 524) (zur Einstellung des pH-Werts).

Dawnzera ist eine klare, farblose bis gelbe Injektionslösung in einem Fertigpen.

### **Zulassungsnummer**

69883 (Swissmedic)

### **Wo erhalten Sie Dawnzera? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Dawnzera ist erhältlich in:

- einer Einzelpackung mit einem Fertigpen

### **ZulassungsinhaberIn**

Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH, Opfikon

Diese Packungsbeilage wurde im Juni 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.




## HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

### Dawnzera 80 mg Injektionslösung im Fertigpen

Diese Hinweise für den Gebrauch enthalten Informationen zur Injektion von **Dawnzera** mit dem Fertigpen.

**Lesen Sie diese Hinweise für den Gebrauch, bevor Sie Ihren Dawnzera-Fertigpen erstmals verwenden, und jedes Mal, wenn Sie eine neue Packung erhalten. Es könnten neue Informationen enthalten sein.**

Diese Informationen ersetzen nicht das Gespräch mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin über Ihre Erkrankung oder Behandlung. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin soll Ihnen oder Ihrer Betreuungsperson zeigen, wie Sie den **Dawnzera-Fertigpen** richtig anwenden. Wenn Sie oder Ihre Betreuungsperson Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.



#### Wichtige Informationen:

- **Dawnzera** wird ausschliesslich unter die Haut injiziert (subkutane Injektion).
- Jeder Fertigpen enthält 1 Einzeldosis und kann nur einmal verwendet werden.
- Entfernen Sie die durchsichtige Schutzkappe **erst**, wenn Sie bereit sind, **Dawnzera** zu injizieren (siehe Schritt 5).
- Geben Sie den Fertigpen **nicht** an andere weiter.
- **Nicht** verwenden, wenn der Fertigpen beschädigt erscheint.

#### Informationen zur Aufbewahrung:


- Bewahren Sie den Fertigpen im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C in der Originalverpackung auf. Nicht einfrieren.
- Bei Bedarf kann der Fertigpen einmalig bis zu 6 Wochen bei unterhalb 30 °C in der Originalverpackung aufbewahrt werden, jedoch nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus.
- Wenn Sie Dawnzera bei unter 30 °C ausserhalb des Kühlschranks aufbewahren, vermerken Sie das Entsorgungsdatum auf der Originalverpackung. Das Entsorgungsdatum entspricht folgendem Datum: Maximal 6 Wochen, nachdem das Arzneimittel aus dem Kühlschrank genommen wurde.
- Wenn Sie den bei Raumtemperatur aufbewahrten Fertigpen nicht innerhalb von 6 Wochen verwenden, entsorgen Sie ihn.
- **Schützen** Sie den Fertigpen vor Hitze.
- Bewahren Sie den Fertigpen bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.
- Bewahren Sie den Fertigpen **nicht** ohne aufgesetzte durchsichtige Schutzkappe auf.

**Dawnzera sowie alle Arzneimittel ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.**

#### Übersicht über Dawnzera




## Einzeldosis-Fertigpen



Alkoholtupfer



Abwurfbehälter



Wattebausch oder Gaze



Kleines Pflaster

## Sonstiges Zubehör (nicht enthalten)

### Vorbereitung der Dawnzera-Injektion

#### Schritt 1: Aus dem Kühlschrank nehmen

- a) Nehmen Sie den Fertigpen aus dem Kühlschrank.  
b) **Lassen Sie den Fertigpen in der Originalverpackung und** lassen Sie den Fertigpen 30 Minuten Raumtemperatur annehmen, bevor Sie das Arzneimittel injizieren. Versuchen Sie **nicht**, den Aufwärmprozess durch andere Wärmequellen, wie z. B. eine Mikrowelle oder heisses Wasser, zu beschleunigen.



#### Schritt 2: Arzneimittel überprüfen



- a) Prüfen Sie das Haltbarkeitsdatum (EXP) auf dem Pen sowie das Entsorgungsdatum auf der Originalverpackung, wenn das Arzneimittel bei unter 30 °C ausserhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde.
- b) Prüfen Sie das Arzneimittel über das Sichtfenster. Das Arzneimittel **Dawnzera** muss klar und farblos bis gelb sein. Es dürfen keine Partikel sichtbar sein. Es ist normal, Luftblasen in der Lösung zu sehen

Sie dürfen den Fertigpen **nicht** verwenden, wenn:

- die durchsichtige Kappe fehlt oder nicht fest sitzt.
- das Haltbarkeitsdatum (EXP) oder das Entsorgungsdatum überschritten ist.
- das Arzneimittel trüb oder verfärbt ist oder Partikel enthält.
- der Fertigpen beschädigt erscheint.

### Schritt 3: Injektionsstelle wählen

- a) Wählen Sie eine Injektionsstelle am Bauch oder an der Vorderseite des Oberschenkels.
- b) Nur Betreuungspersonen dürfen die Rückseite des Oberarms wählen.


Injizieren Sie **nicht**:

- im Bereich von 5 cm um den Bauchnabel herum.
- in einen Bluterguss oder in empfindliche, gerötete, verhärtete, infizierte oder verfärbte Haut.
- in Narbengewebe oder geschädigte Haut.
- in die gleiche Stelle wie bei der vorherigen Injektion.

### Schritt 4: Hände waschen und Injektionsstelle reinigen

- a) Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.
- b) Reinigen Sie die Injektionsstelle in kreisender Bewegung mit einem Alkoholtupfer. Lassen Sie die Haut an der Luft trocknen.
- Berühren Sie die gereinigte Haut vor der Injektion **nicht** mehr.





## Injektion von Dawnzera

### Schritt 5: Durchsichtige Schutzkappe entfernen und entsorgen


- a) Halten Sie den Fertipen so in der Mitte fest, dass die durchsichtige Schutzkappe von Ihnen weg zeigt.
- b) Entfernen Sie die durchsichtige Schutzkappe, indem Sie sie gerade abziehen. Drehen Sie sie nicht ab. Die Nadel befindet sich innerhalb des orangen Nadelschutzes.
- c) Werfen Sie die durchsichtige Schutzkappe in den Hausmüll oder Abwurfbehälter.

Entfernen Sie die durchsichtige Schutzkappe erst direkt vor der Injektion. Setzen Sie die Schutzkappe nicht wieder auf den Fertipen auf. Drücken Sie den orangen Nadelschutz nicht gegen Ihre Hand oder einen Finger.

### Schritt 6: Mit der Injektion beginnen

- a) Halten Sie den Fertipen mit einer Hand. Platzieren Sie den orangen Nadelschutz in einem 90-Grad-Winkel auf Ihrer Haut. Stellen Sie sicher, dass Sie das Sichtfenster sehen können.
- b) Drücken Sie den Fertipen senkrecht, fest gegen die Haut. Sie hören ein Klicken, wenn die Injektion einsetzt. Möglicherweise hören Sie ein zweites Klicken. Dies ist normal. Der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.
- c) Halten Sie den Fertipen 10 Sekunden lang gegen die Haut gedrückt, um sicherzustellen, dass die volle Dosis verabreicht wird. Bewegen, drehen oder verändern Sie den Winkel des Fertipens während der Injektion nicht.





### Schritt 7: Injektion abschliessen

- a) Vergewissern Sie sich, dass die orange Kolbenstange so weit heruntergeschoben ist, dass sie das gesamte Sichtfenster ausfüllt. Wenn die orange Kolbenstange das Sichtfenster nicht ausfüllt, haben Sie möglicherweise nicht die volle Dosis erhalten.  
Wenn dies der Fall ist oder Sie andere Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.
- b) Entfernen Sie den Fertigpen, indem Sie ihn gerade abheben. Nach dem Entfernen aus der Haut rastet der orange Nadelschutz ein und deckt die Nadel ab.
- c) An der Einstichstelle kann eine kleine Menge Blut oder Flüssigkeit zurückbleiben. Dies ist normal.

Drücken Sie bei Bedarf einen Wattebausch oder eine Gaze auf die Stelle und kleben Sie ein kleines Pflaster auf. Sie dürfen den Fertigpen nicht wiederverwenden.

### Entsorgung von Dawnzera

#### Schritt 8: Fertigpen entsorgen

- a) Geben Sie den gebrauchten Fertigpen sofort nach Gebrauch in einen Abwurfbehälter.

Entsorgen Sie den Fertigpen **nicht** im Hausmüll. Sie dürfen den verwendeten Abwurfbehälter **nicht** recyceln. Sie dürfen den Fertigpen oder die durchsichtige Schutzkappe **nicht** wiederverwenden.



Wenn Sie keinen Abwurfbehälter haben, können Sie einen Haushaltsbehälter verwenden, der:

- aus strapazierfähigem Kunststoff besteht,
- mit einem dicht schliessenden, stichfesten Deckel verschlossen werden kann, ohne dass scharfe/spitze Gegenstände herausfallen können,
- während des Gebrauchs aufrecht steht und stabil ist,
- auslaufsicher ist und
- ordnungsgemäss beschriftet ist, um auf gefährliche Abfälle im Behälter hinzuweisen.

Wenn Ihr Abwurfbehälter fast voll ist, müssen Sie ihn fachgerecht entsorgen.

Möglicherweise gibt es örtliche Gesetze darüber, wie gebrauchte Fertigungs- zu entsorgen sind. Anweisungen zur Entsorgung von gebrauchten Abwurfbehältern erhalten Sie bei Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker bzw. Ihrer Apothekerin.

Entsorgen Sie **keine** Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten können in Apotheken oder Sammelstellen abgegeben werden. Sie dürfen den verwendeten Abwurfbehälter **nicht** recyceln.

