

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

***SIMILASAN Constipation*, globules**

Médicament homéopathique

Quand *SIMILASAN Constipation* est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Constipation* peut être utilisé en cas de constipation (chronique, avec crampes), paresse intestinale, selles dures .

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas de constipation rebelle ou chronique, un succès n'intervient souvent qu'au bout de 4 à 6 semaines de traitement.

En cas de constipation, il est important de boire abondamment, de consommer des aliments riches en fibres (légumes, fruits, pain complet) et de faire de l'exercice physique (sport).

Si l'état empire ou si l'amélioration tarde, consulter le médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si *SIMILASAN Constipation* peut être pris simultanément.

Quand *SIMILASAN Constipation* ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Chez les enfants de moins de 12 ans, la constipation et/ou la paresse intestinale doivent être examinées par un médecin. La préparation ne doit donc pas être utilisée sans consultation médicale chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

***SIMILASAN Constipation* peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de



votre droguiste.

Comment utiliser *SIMILASAN Constipation* ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription:

Adolescents à partir de 12 ans et adultes: 7 globules (granules) par prise.

- **Troubles aigus:** 3 fois par jour.
- **Pour parachever la guérison:** 1 fois par jour (matin ou soir).

Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, le dosage de *SIMILASAN Constipation* doit se faire conformément aux instructions du médecin et/ou après consultation médicale.

Prescription d'absorption:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Constipation* peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Constipation* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN Constipation* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Constipation* ?

1 g de globules contient:



Principes actifs

Graphites (HAB) D12 2.500 mg / Magnesium chloratum (HAB) D8 2.500 mg / Sulfur (HAB) D15 2.500 mg / Thuja occidentalis (HAB) D10 2.500mg.

Excipients

xylite (E967) 600 mg et carbonate de calcium

1 g correspond à 70-90 globules

Numéro d'autorisation

51373 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Constipation* ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

