

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Merfen® Octenidin, Gel

VERFORA SA

Was ist Merfen Octenidin, Gel und wann wird es angewendet?

Merfen Octenidin, Gel ist ein Desinfektionsmittel für die Anwendung auf der Haut. Es tötet Bakterien und Pilze ab und wirkt zusätzlich gegen Viren.

Merfen Octenidin, Gel wird angewendet zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Behandlung (Desinfektion) von kleinen oberflächlichen Wunden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Grossflächige, stark verschmutzte und tiefe Wunden sowie Biss- und Stichwunden benötigen eine ärztliche Behandlung (Gefahr von Wundstarrkrampf). Bleibt der Umfang einer Wunde während einiger Zeit unverändert gross oder verheilt die Wunde nicht innerhalb von 10 bis 14 Tagen, ist ebenfalls ein Arztbesuch erforderlich. Ebenso, wenn die Wundränder stark gerötet sind, die Wunde plötzlich anschwillt, stark schmerzhaft ist oder die Verletzung von Fieber begleitet wird (Gefahr einer Blutvergiftung).

Wann darf Merfen Octenidin, Gel nicht angewendet werden?

Sie dürfen Merfen Octenidin, Gel nicht anwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Merfen Octenidin, Gel darf nicht im Ohr oder am Auge angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von Merfen Octenidin, Gel Vorsicht geboten?

Merfen Octenidin, Gel darf ohne ärztliche Überwachung nicht über einen längeren Zeitraum (2 Wochen) angewendet werden (siehe auch «Was sollte dazu beachtet werden?»).

Nicht einnehmen. Merfen Octenidin Gel ist nur für die äusserliche Anwendung bestimmt.

Merfen Octenidin, Gel nicht auf oder in der Nähe von Hautstellen anwenden, die mit Desinfektionsmitteln auf der Basis von PVP-Iod behandelt wurden. Dabei kann es im Grenzbereich zu starken braunen bis violetten Färbungen kommen.

Bringen Sie das Arzneimittel nicht in Kontakt mit Seifen, da diese seine Wirkung verringern können.

Ein Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt muss sofort mit reichlich Wasser gespült werden.

Nach Spülung tiefer Wunden mittels Spritze wurde über das Auftreten von Gewebeschädigungen berichtet. Deshalb darf Merfen Octenidin nur oberflächlich angewendet werden. Nicht bei tiefen Wunden anwenden.

Die Anwendung sollte bei Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeborenen, mit Vorsicht erfolgen. Merfen Octenidin kann schwere Hautschäden verursachen. Überschüssiges Arzneimittel entfernen und sicherstellen, dass das Gel nicht länger als nötig auf der Haut verbleibt (einschließlich mit dem Gel benetzte Materialien mit direktem Kontakt zum Patienten).

Merfen Octenidin Gel enthält Butylhydroxytoluol (E 321), welches lokale Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) sowie eine Reizung von Augen und Schleimhäuten hervorrufen kann.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,



- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Merfen Octenidin, Gel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Merfen Octenidin, Gel soll in der Schwangerschaft nur ausnahmsweise und auf Anweisung des Arztes bzw. der Ärztin angewendet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Merfen Octenidin in die Muttermilch übergeht. Ist eine Anwendung von Merfen Octenidin Gel in der Stillzeit notwendig, sollte das Arzneimittel nur kurzfristig auf kleinen Flächen und nicht im Bereich der Brust der stillenden Mutter angewendet werden.

Wie verwenden Sie Merfen Octenidin, Gel?

Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf Merfen Octenidin, Gel sorgfältig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Die Wunde muss dabei vollständig bedeckt werden. Warten Sie mindestens 1–2 Minuten vor weiteren Massnahmen, wie z.B. dem Anlegen eines Wundverbandes.

Nur bei kleinen, oberflächlichen Wunden anwenden. Das Arzneimittel ohne ärztliche Kontrolle nicht länger als 2 Wochen anwenden.

Merfen Octenidin Gel kann bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen angewendet werden. Bei Kindern unter 6 Jahren soll die Anwendung von Merfen Octenidin auf wenige Tage beschränkt werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Merfen Octenidin, Gel haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Merfen Octenidin, Gel auftreten:

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Anwendern)

Brennen, Rötungen, Juckreiz an der behandelten Stelle, Wärmegefühl und ein leichtes pelziges Gefühl auf der Haut.

Sehr selten (betrifft 1 bis 10 von 100'000 Anwendern)

Kontaktallergische Reaktionen wie z.B. vorübergehende Rötung der behandelten Stelle.

Bei Anwendung an der Mundschleimhaut wurde über vorübergehenden bitteren Geschmack berichtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Aufbrauchfrist nach Anbruch

Aufbrauchfrist nach Anbruch der Tube: 12 Monate

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Weitere Hinweise

Merfen Octenidin ist ein klares, durchsichtiges Gel, das bei niedrigen Temperaturen (unter 15°C) dünnflüssig und bei höheren Temperaturen zähflüssig wird.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Merfen Octenidin, Gel enthalten?



Wirkstoffe

1 g Merfen Octenidin enthält 1 mg Octenidindihydrochlorid.

Hilfsstoffe

Phenoxyethanol, Ethanol, Glycerol, Poloxamer 407 [enthält Butylhydroxytoluol] und gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

67770 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Merfen Octenidin, Gel? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Es gibt eine Tube zu 30 g.

Zulassungsinhaberin

VERFORA AG, Villars-sur-Glâne

Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

