

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Engystol, comprimés

Médicament homéopathique

Quand Engystol est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Engystol peut être utilisé en cas de symptômes grippaux. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Engystol peut être pris simultanément. En cas de fièvre élevée ou en cas d'aggravation de l'état général ainsi que de plaintes persistantes, consulter rapidement le médecin, en particulier chez des enfants. En règle générale, chez les enfants en dessous de 2 ans, l'apparition d'une fièvre élevée ou une élévation progressive de la fièvre doit faire l'objet d'une consultation médicale.

Quand Engystol ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants, ce médicament ne doit pas être pris. Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Engystol peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Engystol?



Sauf prescription contraire du médecin, laisser fondre dans la bouche 1 comprimé 3 fois par jour. Chez les enfants en-dessous de 6 ans, il faut écraser le comprimé et le dissoudre dans l'eau, avant de le prendre 3 fois par jour. Ne doublez pas la dose, si vous oubliez de prendre la dose précédente.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Engystol peut-il provoquer?

La fréquence est indéterminée: (elle ne peut pas être estimée à partir des données disponibles):

Réactions d'hypersensibilité (telles que des réactions cutanées (éruption cutanée, démangeaisons, rougeur) ou des problèmes gastro-intestinaux (diarrhée, douleurs abdominales)).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Engystol et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Engystol?

1 comprimé (301,5 mg) contient:

Principes actifs

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D6 75 mg;

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D10 75 mg;

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D30 75 mg;

Sulfur (HAB) D4 (HAB 6) 37,5 mg;

Sulfur (HAB) D10 (HAB SV) 37,5 mg.

Excipients

Lactose monohydraté 300 mg, magnésium stéarate.

Numéro d'autorisation



52651 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Engystol? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 50 et 250 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

