

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Engystol, compresse

Medicamento omeopatico

Quando si usa Engystol?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Engystol può essere usato in caso di sintomi influenzali.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Engystol. In caso di febbre alta o se c'è un peggioramento dello stato generale e lamentele persistenti, è indicato di consultare rapidamente un medico, particolarmente i bambini. Per principio, in caso di febbre alta dei bambini sotto due anni, si deve consultare un medico.

Quando non si può assumere Engystol e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di nota ipersensibilità a uno o più ingredienti, questo medicinale non deve essere assunto. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere Engystol durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Engystol?

Salvo diversa prescrizione medica: lasciare sciogliere in bocca 1 compressa 3 volte al giorno. Bambini sotto i 6 anni: assumere la compressa soltanto schiacciata e sciolta in acqua, 3 volte al giorno.

Non assumere una dose doppia se si dimentica di prendere la dose precedente.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che



l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Engystol?

Frequenza non nota: (non può essere stimata sulla base dei dati disponibili). Reazioni di ipersensibilità (come: reazioni cutanee (eruzione cutanea, prurito, arrossamento) o disturbi gastrointestinali (diarrea, dolore addominale)). Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Engystol e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Engystol?

1 compressa (301,5 mg) contiene:

Principi attivi

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D6 75 mg;

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D10 75 mg;

Vincetoxicum hirundinaria (HAB) D30 75 mg;

Sulfur (HAB) D4 (HAB 6) 37,5 mg;

Sulfur (HAB) D10 (HAB SV) 37,5 mg.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato 300 mg, magnesio stearato

Numero dell'omologazione

52651 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Engystol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 e 250 compresse.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach



Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

