

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

VICKS® Nasivin Classic 0.05%, solution pour pulvérisation nasale

Qu'est-ce que VICKS Nasivin Classic et quand doit-il être utilisé ?

VICKS Nasivin Classic est un médicament contre le rhume qui permet d'en combattre les symptômes. Le principe actif de VICKS Nasivin Classic, l'oxymétazoline a un effet vasoconstricteur. Il agit donc en décongestionnant la muqueuse et en facilitant la respiration lors d'un rhume. L'effet s'installe en l'espace d'une minute et persiste pendant 12 heures.

Sur recommandation d'un médecin ou d'un pharmacien, VICKS Nasivin Classic peut être utilisé comme préparation décongestionnante contre les sinusites et le catarrhe tubaire.

Quand VICKS Nasivin Classic ne doit-il pas être utilisé ?

VICKS Nasivin Classic ne doit pas être utilisé en cas de sécheresse de la muqueuse nasale accompagnée de croûtes (rhinite sèche), d'hypersensibilité à l'un des composants de la préparation et de glaucome (glaucome à angle fermé).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de VICKS Nasivin Classic ?

VICKS Nasivin Classic pulvérisation nasale 0.05 % ne doit être utilisé que chez l'adulte et les enfants d'âge scolaire dès 6 ans.

VICKS Nasivin Classic ne doit pas être employé plus de 5 à 7 jours sans avis médical. Un usage prolongé peut déclencher une tuméfaction de la muqueuse nasale d'origine médicamenteuse, dont les symptômes sont très proches de ceux d'un rhume.

VICKS Nasivin Classic doit être utilisé avec prudence chez les patients qui sont traités avec certains médicaments contre la dépression (inhibiteurs de la MAO), atteints d'hypertension et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'en cas d'hyperthyroïdie et de diabète sucré.

L'utilisation prolongée de VICKS Nasivin Classic peut entraîner une lésion de la muqueuse nasale.

L'utilisation prolongée de VICKS Nasivin Classic ainsi que l'utilisation d'une dose plus élevée que celle recommandée peut entraver l'aptitude à la conduite de véhicules ou à l'utilisation de machines.

Ce médicament contient 0.002 mg de chlorure de benzalkonium par pulvérisation, soit 0.05 mg/ml. Le chlorure de benzalkonium peut provoquer une irritation ou un gonflement de la muqueuse nasale, surtout lorsqu'il est utilisé longtemps.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).



VICKS Nasivin Classic peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Si vous êtes enceinte, si vous souhaitez le devenir ou si vous allaitez, vous ne devez pas utiliser VICKS Nasivin Classic ou seulement après avoir consulté votre médecin.

Comment utiliser VICKS Nasivin Classic ?

Sauf prescription contraire de votre médecin, les doses suivantes ne doivent pas être dépassées:

Adultes et enfants d'âge scolaire (dès 6 ans): appliquer 1 nébulisation de VICKS Nasivin Classic pulvérisation nasale 0.05 % dans chaque narine 2–3 fois par jour.

Sans ordonnance médicale, n'utilisez VICKS Nasivin Classic que durant une période limitée (5–7 jours).

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires VICKS Nasivin Classic peut-il provoquer ?

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Une circulation sanguine plus importante temporairement au niveau de la muqueuse nasale après disparition de l'effet du médicament est fréquente.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Une gêne, des irritations, des brûlures et une sécheresse de la muqueuse nasale, buccale, ou de la gorge, des éternuements, des nausées, des maux de tête, des irritations et une rougeur oculaire. En outre, une insomnie, une nervosité, des tremblements, une agitation, une anxiété, une irritabilité, une hypertension, une accélération du pouls ou des palpitations, des troubles du rythme cardiaque (battements cardiaques irréguliers), des troubles de la vidange vésicale peuvent apparaître, signes qui disparaissent après réduction de la posologie ou interruption du traitement. Occasionnellement, après atténuation des effets thérapeutiques peuvent apparaître une sensation d'obstruction nasale plus importante ainsi qu'une perte d'efficacité.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Réactions d'hypersensibilité (allergies).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

Après la première ouverture, ne pas utiliser pendant plus de 6 mois.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres



de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Instructions de stockage

Conserver hors de la portée des enfants ! Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient VICKS Nasivin Classic ?

Principes actifs

1 ml de solution de VICKS Nasivin Classic pulvérisation nasale 0.05 % contient 0.5 mg de chlorhydrate d'oxymétazoline.

1 pulvérisation (=0.045 ml) contient 0.022 mg de chlorhydrate d'oxymétazoline.

Excipients

Chlorure de benzalkonium, acide citrique (E 330), citrate de sodium dihydrate (E 331), glycerol 85% (E 422), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

45138 (Swissmedic).

Où obtenez-vous VICKS Nasivin Classic ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale:

VICKS Nasivin Classic 0.05 % solution pour pulvérisation nasale pour adultes et enfants d'âge scolaire 10 ml. Correspond à min. 143 pulvérisations.

Titulaire de l'autorisation

Procter & Gamble International Operations SA, Lancy.

Domicile : 1213 Petit-Lancy

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

