

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Itinerol® B6 Supposte

VERFORA SA

Che cos'è Itinerol B6 e quando si usa?

Le supposte Itinerol B6 contengono principi attivi che prevengono o fanno cessare la nausea ed i vomiti. Il loro effetto persiste 12 a 24 ore. Itinerol B6 è indicato contro la nausea ed i vomiti di varia origine, in particolare: disturbi di viaggio; vomiti da gravidanza (solo con prescrizione del medico e in caso d'estrema necessità); vomiti abituali, nervosi e acetonefici dei bambini e lattanti; per i bambini di meno di 6 anni: solo su prescrizione medica.

Quando non si può usare Itinerol B6?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti, particolarmente alla meclozina o alla vitamina B6 (piridossina).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Itinerol B6?

Nel caso in cui soffre di glaucoma ad angolo chiuso o d'ipertrofia della prostata, informi il suo medico prima di prendere Itinerol B6. La meclozina, uno dei principi attivi di Itinerol B6, rinforza l'effetto dei barbiturici, dei tranquillanti e dell'alcol. La piridossina (vitamina B6) riduce gli effetti della levodopa (principio attivo di certi medicinali contro la malattia di Parkinson). Gli automobilisti e conduttori di macchine terranno presente che a volte il preparato può provocare una sensazione di stanchezza, riducendo così la capacità di reazione, la capacità di utilizzare attrezzi o macchine e la capacità di condurre un veicolo. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, se soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Itinerol B6 durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza si deve prendere Itinerol B6 solo su prescrizione medica e in caso di urgente necessità. Se un trattamento con Itinerol B6 è indispensabile durante l'allattamento, si deve svezzare il lattante.

Come usare Itinerol B6?

Salvo diversa prescrizione del medico:

Vomito e nausea di diversa origine, dose per 24 ore

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1-2 supposte per adulti e adolescenti.

Bambini dai 6 ai 12 anni: 1 supposta per bambini dai 6 ai 12 anni.

Solo su prescrizione medica:

Lattanti e bambini dai 3 mesi ai 6 anni: 1 supposta per lattanti e bambini dai 3 mesi ai 6 anni.

Disturbi di viaggio (1 ora prima della partenza), dose per 24 ore

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni: 1 supposta per adulti e adolescenti.

Bambini dai 6 ai 12 anni: 1 supposta per bambini dai 6 ai 12 anni.

Solo su prescrizione medica:

Lattanti e bambini dai 3 mesi ai 6 anni: 1 supposta per lattanti e bambini dai 3 mesi ai 6 anni.



Vomiti da gravidanza

Solo su prescrizione medica:

La sera e se necessario al mattino: 1 supposta per adulti e adolescenti.

Non superare 2 supposte per 24 ore.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Itinerol B6?

Con l'uso di Itinerol B6 possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Tachicardia.

Secchezza delle fauci.

Disturbi gastrici.

Diarrea.

Vomito.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Sensazione di stanchezza (generalmente compensata dalla caffeina).

Visione offuscata.

Molto raro (riguarda meno di una persona su 10'000)

Orticaria.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni relative alla conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il contenitore nella scatola originale per proteggere il contenuto dall'umidità.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Itinerol B6?

Principi attivi

1 supposta per adulti e adolescenti contiene:

50 mg di meclozina dicloridrato, 50 mg di piridossina cloridrato (vitamina B6) e 20 mg di caffeina.

1 supposta per bambini dai 6 ai 12 anni contiene:



20 mg di meclozina dicloridrato, 20 mg di piridossina cloridrato (vitamina B6) e 10 mg di caffeina.

1 supposta per neonati e bambini dai 3 mesi ai 6 anni contiene:

10 mg di meclozina dicloridrato e 10 mg di piridossina cloridrato (vitamina B6).

Sostanze ausiliarie

1 supposta contiene: gliceridi semisintetici solidi.

Numero dell'omologazione

18383, 23560 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Itinerol B6? Quali confezioni sono disponibili?

Itinerol B6 è disponibile in farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica nelle confezioni seguente:

Scatola di 10 *supposte per adulti e adolescenti*.

Scatola di 6 *supposte per bambini dai 6 ai 12 anni*.

Itinerol B6 è disponibile in farmacia, dietro presentazione della ricetta medica, nella confezione seguente:

Scatola di 6 *supposte per lattanti e bambini dai 3 mesi ai 6 anni*.

Itinerol B6 esiste ugualmente sotto forma di capsule (a partire da 12 anni).

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

