

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Echinaforce® Résistance – refroidissement Junior, comprimés

Médicament phytothérapeutique

Qu'est-ce que Echinaforce Résistance – refroidissement Junior et quand doit-il être utilisé ?

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior est une préparation à base de plantes fraîches composée des parties aériennes fraîches en fleurs et des racines fraîches de rudbeckie rouge. Echinaforce Résistance – Refroidissement Junior est indiqué en cas de tendance aux refroidissements. Il en favorise en outre le processus de guérison. Echinaforce Résistance – refroidissement Junior renforce les défenses de l'organisme, notamment en cas de tendance aux refroidissements ou de refroidissement fébrile.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas d'aggravation des symptômes ou d'apparition d'une forte fièvre, il convient de contacter un médecin.

Quand Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ne doit-il pas être pris/utilisé ?

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des constituants ou aux plantes de la famille des astéracées (Asteraceae), comme la camomille, l'arnica, le souci (Calendula), l'achillée millefeuille (Achillea millefolium), les pâquerettes (Bellis perennis), le rudbeckie (Echinacea).

En cas de réactions d'hypersensibilité ou de réactions circulatoires, le traitement doit être immédiatement interrompu.

Les patients qui souffrent d'une maladie allergique préexistante (maladie atopique) présentent un risque accru de réactions allergiques graves.

En raison des propriétés immunomodulatrices connues des préparations d'Echinacea purpurea, l'utilisation de ces préparations n'est pas recommandée en cas de maladies systémiques évolutives (comme la tuberculose), de maladies systémiques du système des globules blancs (leucémie, leucoses), de maladies auto-immunes (collagénoses, sclérose en plaques) ainsi qu'en cas de déficience immunitaire (SIDA ou infection par le VIH) et d'autres maladies du système immunitaire.

Les extraits d'Echinacea purpurea pourraient influencer l'efficacité des médicaments immunosuppresseurs en raison de l'effet immunostimulant possible de ces extraits.

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 4 ans, car l'expérience sur l'utilisation dans ce groupe de patients n'est pas suffisante.

Ce médicament contient 266 mg de sorbitol par comprimé.

Le sorbitol est une source de fructose. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre/recevoir ce médicament si votre médecin vous a informé que vous (ou votre enfant) présentez une intolérance à



certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF) – une maladie congénitale rare dans laquelle une personne ne peut pas métaboliser le fructose. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre Echinaforce Résistance – refroidissement Junior si vous savez que vous avez une intolérance à certains sucres.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'autres maladies,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ?

En cas de tendance aux refroidissements (prévention) : Enfants à partir de 4 ans, 1 comprimé 3 fois par jour et adolescents à partir de 12 ans, 2 comprimés 3 fois par jour; à laisser fondre dans la bouche.

En cas de refroidissements ou d'état fébrile (aigus) : Enfants à partir de 4 ans, 1 comprimé 3 à 5 fois par jour et adolescents à partir de 12 ans, 2 comprimés 3 à 5 fois par jour; à laisser fondre dans la bouche. Le traitement ne devrait pas se poursuivre au-delà de 2 mois sans interruption.

Dans le traitement aigu, Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ne doit pas être pris pendant plus de 10 jours et le traitement doit être commencé dès les premiers signes de la maladie.

En cas de tendance élevée aux refroidissements (6 fois ou davantage par an) chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin.

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 4 ans, car l'expérience sur l'utilisation et la sécurité dans ce groupe de patients n'est pas suffisante.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Echinaforce Résistance – refroidissement Junior peut-il provoquer ?

La prise d'Echinaforce Résistance – refroidissement Junior peut provoquer les effets secondaires suivants: dans de rares cas, on a pu observer des réactions d'hypersensibilité (telles qu'éruptions cutanées et démangeaisons).

Très rares: En particulier chez les patients souffrant d'une maladie atopique, il existe un risque accru de réactions allergiques graves, telles que l'asthme (bronchospasme), des réactions circulatoires (choc), des réactions cutanées graves (syndrome de Stevens-Johnson), des gonflements du visage.

En tel cas, interrompre immédiatement le traitement et consulter un médecin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.



À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ne doit pas être utilisé après la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Les emballages non utilisés ou périmés doivent être rapportés à votre pharmacien ou à votre droguiste pour être éliminés.

Votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste vous donnera de plus amples informations.

Que contient Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ?

1 comprimé contient:

Principes actifs

Extrait épais de: 380 mg de teinture de rudbeckie rouge fraîche (*Echinacea purpurea* L. Moench, herba), rapport drogue-agent d'extraction 1:12, l'agent d'extraction éthanol 65 % (V/V) correspondant à 5.9 mg de matière sèche et 20 mg de teinture de racine fraîche de rudbeckie rouge (*Echinacea purpurea* L. Moench, radix), rapport drogue-agent d'extraction 1:11, l'agent d'extraction éthanol 65 % (V/V) correspondant à 0.3 mg de matière sèche.

Excipients

266.15 mg de sorbitol (E 420), bêta-cyclodextrine, dioxyde de silicium hautement dispersé, arôme naturel d'orange (contient 0.92 mg de saccharose), stéarate de magnésium (E 470b).

Numéro d'autorisation

58192 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Echinaforce Résistance – refroidissement Junior ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale, en emballages de 120 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

A.Vogel AG, CH-9325 Roggwil TG

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

