

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fexofénadine Sandoz® 180 mg

Sandoz Pharmaceuticals AG

Che cos'è Fexofénadine Sandoz 180 mg e quando si usa?

Fexofénadine Sandoz è un antistaminico utilizzato per il trattamento dell'orticaria, una dermatosi allergica, e agisce contro i suoi sintomi come arrossamento cutaneo o sensazione di o prurito.

Quando non si può assumere Fexofénadine Sandoz 180 mg?

Fexofénadine Sandoz compresse rivestite con film non può essere assunto da persone che presentano un'ipersensibilità già nota a uno dei suoi componenti.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono assumere Fexofénadine Sandoz.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Fexofénadine Sandoz 180 mg?

Si consiglia di assumere eventuali preparati antiacidi a base di idrossido di alluminio o di magnesio a distanza di due ore dall'assunzione di Fexofénadine Sandoz.

Prove specifiche (ad es. durante la guida) hanno mostrato che normalmente il principio attivo di Fexofénadine Sandoz ha un effetto minimo sulle prestazioni e sulla concentrazione e non rende particolarmente stanchi o assonnati, proprio come un placebo (compressa senza principio attivo). Le persone particolarmente sensibili dovranno tuttavia verificare prima la loro reazione personale a Fexofénadine Sandoz.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».

- Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Fexofénadine Sandoz 180 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora stati condotti studi scientifici sistematici. A titolo precauzionale, durante la gravidanza e l'allattamento bisognerebbe astenersi se possibile dall'assumere medicinali o chiedere consiglio al medico, al farmacista o droghiere.

Come usare Fexofénadine Sandoz 180 mg?

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:

Fexofénadine Sandoz: 1 compressa rivestita (180 mg) 1 volta al giorno (preferibilmente al mattino).

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta.

Le compresse rivestite con film da 180 mg di Fexofénadine Sandoz hanno una scanalatura decorativa e pertanto non possono essere divise in due metà.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.



Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Fexofénadine Sandoz 180 mg?

In seguito all'assunzione di Fexofénadine Sandoz, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Mal di testa, sonnolenza, vertigini, nausea. La frequenza degli effetti collaterali osservati con il principio attivo di Fexofénadine Sandoz corrisponde a quella osservata durante un trattamento con il placebo (compresse senza principio attivo).

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Diarrea, bocca secca, tachicardia e palpitazioni.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Stanchezza, insonnia, nervosismo, disturbi del sonno oppure incubi, eruzioni cutanee, orticaria e sensazione di prurito.

In casi rari sono state segnalate reazioni di ipersensibilità che si manifestano con edemi (accumulo di acqua nei tessuti), dispnee, oppressione al torace, arrossamenti cutanei con sensazione di calore.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, non al di sopra di 25°C, e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fexofénadine Sandoz 180 mg?

1 compressa rivestita con film contiene:

Principi attivi

180 mg di fexofenadina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, amido di mais, croscarmellosa di sodio, povidono K30, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, macrogol 4000, ossido di ferro gialla (E172).

Una compressa rivestita con film di Fexofénadine Sandoz 180 mg contiene massimo 0,3 mg di sodio.

Numero dell'omologazione

66343 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fexofénadine Sandoz 180 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o in drogheria senza prescrizione medica:

Confezioni da 10 e da 30 *compresse rivestite con film* (con scanalatura decorativa).

Titolare dell'omologazione



Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

