

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Ignatia-Homaccord, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Ignatia-Homaccord, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Ignatia-Homaccord, gocce si può usare, su prescrizione del suo medico, in caso di stati d'eccitazione isterici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Ignatia-Homaccord, gocce. In caso di improvvisi o prolungati disturbi, quali irregolarità del polso, forti palpitazioni, dolori pungenti nella zona toracica ed insufficienza respiratoria sarà opportuno consultare un medico. Quest'ultimo stabilirà se il cuore o i vasi sanguigni sono colpiti da una patologia organica o se i disturbi sono di natura nervosa.

Quando non si può usare Ignatia-Homaccord, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa). Ignatia-Homaccord, gocce contiene 35 vol. % d'alcol.

Si può usare Ignatia-Homaccord, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Ignatia-Homaccord, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica negli adulti, prendere 10 gocce 3 volte al giorno. Nei casi acuti, inizialmente 10 gocce ogni 15 minuti. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell'Ignatia-Homaccord, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Ignatia-Homaccord, gocce?



Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Ignatia-Homaccord, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'uso di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Ignatia-Homaccord, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico o il farmacista può darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Ignatia-Homaccord, gocce?

1 ml di soluzione contiene: Moschus moschiferus D6 5 µl; Moschus moschiferus D30 5 µl; Moschus moschiferus D200 5 µl; Strychnos ignatii D4 5 µl; Strychnos ignatii D10 5 µl; Strychnos ignatii D30 5 µl; Strychnos ignatii D200 5 µl.

Questo preparato contiene 35 % vol. di alcol come sostanza ausiliaria.

Numero dell'omologazione

51637 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Ignatia-Homaccord gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Flaconcini da 30 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2003 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

