

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sportusal® Emgel/Gel

Permamed AG

Che cos'è Sportusal Emgel/Gel e quando si usa?

Sportusal emgel e gel contengono un'associazione di principi attivi analgesici, antiinfiammatori e detumefacenti. L'idrossietile salicilato combatte il dolore e l'infiammazione. L'eparina inibisce la coagulazione del sangue e migliora il riassorbimento degli ematomi e dei gonfiori. Il DMSO favorisce l'assorbimento di questi principi attivi nell'organismo attraverso la pelle.

Sportusal emgel e gel sono indicati per uso esterno nei seguenti disturbi:

- traumi dovuti allo sport e a infortuni quali contusioni, strappi, distorsioni con ematomi e gonfiori;
- infiammazioni della muscolatura e dell'apparato legamentoso;
- malattie delle vene delle gambe con disturbi quali dolori, senso di pesantezza, gambe gonfie (edemi da stasi);
- su prescrizione medica lo Sportusal emgel/gel si può usare anche per la terapia di infiammazioni superficiali delle vene.

Sportusal emgel e gel hanno effetto rinfrescante e non ungono.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Segua i consigli del suo medico anche non riguardanti la posologia, come per esempio, in caso di malattie delle vene, fare ginnastica o portare calze elastiche.

Quando non si può usare Sportusal Emgel/Gel?

Sportusal emgel e gel non si devono applicare su ferite aperte o su pelle lesa, non devono venire a contatto con gli occhi o le mucose e non si devono usare in caso di ipersensibilità o intolleranza nota a uno dei loro costituenti, di gravi disfunzioni del fegato e dei reni, di tendenza alle emorragie, di disturbi della coagulazione del sangue, di trombocitopenia (carenza di piastrine) nota indotta dall'eparina o associata all'eparina, di disturbi circolatori, di asma bronchiale e nei bambini sotto i cinque anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Sportusal Emgel/Gel?

Nei bambini e nei pazienti con malattie dei reni Sportusal emgel e gel vanno usati solo su piccole superfici cutanee e per non più di alcuni giorni. Se in Lei in precedenti trattamenti con certi medicinali antiinfiammatori si sono manifestate delle reazioni di ipersensibilità, prima di usare Sportusal emgel e gel parli col suo medico. Le zone del corpo trattate con Sportusal emgel e gel non si devono coprire con fasciature impermeabili all'aria. Nelle malattie delle vene dovute alla presenza di un coagulo di sangue (le cosiddette trombosi) *non* si deve massaggiare.

In caso di aggravamento dei sintomi bisogna consultare un medico.

Questo medicinale contiene cumarina come profumo e può causare reazioni allergiche.

Sportusal Gel contiene 70 mg/g di glicole propilenico come eccipiente, che può causare irritazioni cutanee.

Sportusal Gel contiene 200 mg/g di alcool (etanolo). Se la pelle è lesa, questo ingrediente può causare una sensazione di bruciore.



Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffra di altre malattie, soffra di allergie o assuma o applichi per uso esterno altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Sportusal Emgel/Gel durante la gravidanza o l'allattamento?

Sportusal emgel e gel non si possono usare durante la gravidanza e l'allattamento, salvo su esplicita prescrizione medica.

Come usare Sportusal Emgel/Gel?

Adulti:

Salvo diversa prescrizione del medico, applicare e distribuire più volte al giorno lo Sportusal emgel o gel sulle parti interessate.

Non applicare Sportusal emgel e gel su ferite aperte o su pelle lesa. Se per ragioni terapeutiche sono necessarie delle fasciature esse devono essere permeabili all'aria e vanno messe al più presto cinque minuti dopo aver applicato lo Sportusal emgel/gel. I pazienti con malattie delle vene che durante il giorno portano calze o fasciature compressive devono usare Sportusal emgel e gel solo alla sera.

L'uso e la sicurezza dello Sportusal emgel/gel nei bambini e negli adolescenti non sono finora stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Sportusal Emgel/Gel?

In seguito all'uso di Sportusal emgel e gel possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

In rari casi possono verificarsi dei fenomeni allergici a livello della pelle. Se si manifestano delle reazioni di questo genere bisogna cessare subito di usare il medicamento e all'occorrenza avvertire il medico. Arrossamenti della pelle, prurito e bruciore occasionali sono dovuti all'effetto vasodilatatore dello Sportusal emgel/gel e in generale scompaiono nell'ulteriore corso del trattamento.

L'uso di Sportusal emgel e gel può causare un odore d'aglio passeggero dell'alito. In rari casi possono manifestarsi nausea e mal di testa.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Non ingerire lo Sportusal emgel/gel e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) e proteggere dall'irradiazione solare diretta e dal gelo.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sportusal Emgel/Gel?

Principi attivi

1 g di Sportusal emgel contiene come principi attivi: 500 U.I. di eparina sodica, 100 mg di idrossietile salicilato, 50 mg di dimetilsolfossido (DMSO) e 25 mg di Macrogol 9 laurile etere (polidocanolo 600).

1 g di Sportusal gel contiene come principi attivi: 500 U.I. di eparina sodica, 100 mg di idrossietile salicilato, 50 mg di dimetilsolfossido (DMSO), 20 mg di Macrogol 9 laurile etere (polidocanolo 600).

Sostanze ausiliarie

1 g di Sportusal Emgel contiene come sostanze ausiliarie: glicerolo monostearato, macrogol-100-stearato, macrogol-2-stearato, dexpantenolo, dimeticone, carbomer 974P, levomentolo, olio di rosmarino, cumarina, olio di lavandina, poliquaternio 11, pentadecalactone, idrossido di sodio, acqua depurata.



1 g Sportusal Gel contiene come sostanze ausiliarie: dexpantenolo, Carbomer 980, etanolo 96%, glicole propilenico (E 1520), glicerina 85%, isopropanolo, levomentolo, olio di rosmarino, cumarina, olio di lavandina, pentadecalactone, idrossido di sodio , acqua depurata.

Numero dell'omologazione

47077, 47078 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile Sportusal Emgel/Gel? Quali confezioni sono disponibili?

Sportusal emgel e gel sono in vendita in farmacia e in drogheria senza prescrizione medica, in tubetti da 50 g e da 100 g.

Titolare dell'omologazione

Permamed SA, CH-4143 Dornach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

