

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **Fusicutan® Creme**

**Dermapharm AG**

### **Was ist Fusicutan und wann wird es angewendet?**

Fusicutan ist ein Antibiotikum und wird auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin zur Bekämpfung und Vorbeugung bakterieller Infektionen der Haut eingesetzt.

Die Fusicutan Creme eignet sich speziell für Gesichts- und Kopfhautinfektionen.

### **Wann darf Fusicutan nicht angewendet werden?**

Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Fusidinsäure oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung dürfen Sie Fusicutan nicht benützen (siehe auch «Was ist in Fusicutan enthalten?»).

### **Wann ist bei der Anwendung von Fusicutan Vorsicht geboten?**

Wenn eine Hautkrankheit nicht innert einiger Tage auf die Behandlung anspricht, konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin; eine Allergie oder eine Infektion durch unempfindliche Keime könnten die Ursache sein.

Bei der Anwendung im Gesicht sollte der Kontakt mit den Augen vermieden werden.

Fusicutan enthält Cetylalkohol, Kaliumsorbat (E202) sowie Butylhydroxyanisol (E320), welches lokale Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen kann. Butylhydroxyanisol (E320) kann zusätzlich Irritationen der Augen und Schleimhäute auslösen.

Bei der Behandlung mit Fusicutan im Bereich der Geschlechtsorgane oder des Darmausganges kann es wegen der Hilfsstoffe Paraffin und Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reissfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

### **Darf Fusicutan während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?**

Verwenden Sie Fusicutan, wenn Sie schwanger sind, es werden möchten oder stillen, nur nach Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin. Wird Fusicutan vom Arzt oder der Ärztin während der Stillzeit verordnet, so soll das Präparat nicht auf die Brust aufgetragen werden.

### **Wie verwenden Sie Fusicutan?**

Fusicutan Creme wird, wenn vom Arzt oder von der Ärztin nicht anders verordnet, während 7 Tagen 2–3x täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

### **Welche Nebenwirkungen kann Fusicutan haben?**

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Fusicutan auftreten:



Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Behandelten) wurden Entzündungen der Haut (inkl. Ekzem), Hautausschlag (kann mit Pusteln, Bläschen und Rötung einhergehen), Juckreiz, Hautrötung, Schmerzen (inkl. Gefühl des Hautbrennens) oder Reizung an der Anwendungsstelle

beobachtet.

In seltenen Fällen (betrifft 1 bis 10 von 10'000 Behandelten) treten Überempfindlichkeitsreaktionen, Bindehautentzündung, Angioödem (plötzlich auftretende, schmerzlose Schwellung von Haut und Schleimhaut), Nesselsucht oder Blasenbildung auf.

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen, insbesondere wenn diese mit einer Schwellung von Haut und Schleimhäuten einhergehen, sowie beim Auftreten von Nesselsucht und Blasenbildung, informieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **Was ist ferner zu beachten?**

#### *Lagerungshinweis*

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Fusicutan Creme nicht über 30 °C lagern.

#### *Haltbarkeit*

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

#### *Aufbrauchfrist nach Anbruch*

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

#### *Weitere Hinweise*

Verfallene Arzneimittel sollten zur Entsorgung in die Apotheke gebracht werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

### **Was ist in Fusicutan enthalten?**

#### *Wirkstoffe*

1 g Creme enthält als Wirkstoff 20,3 mg Fusidinsäure (0,5 H<sub>2</sub>O) entsprechend 20,0 mg wasserfreier Fusidinsäure.

#### *Hilfsstoffe*

Gereinigtes Wasser, dickflüssiges Paraffin, Glycerol 85 %, Cetylalkohol, weisses Vaseline, Polysorbat 60, Salzsäure 10 %, Kaliumsorbat (E202), Butylhydroxyanisol (E320), all-rac- $\alpha$ -Tocopherol (E307).

### **Zulassungsnummer**

61359 (Swissmedic)

### **Wo erhalten Sie Fusicutan? Welche Packungen sind erhältlich?**

Fusicutan Creme erhalten Sie in Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Creme: Tuben zu 15 g und 30 g

### **Zulassungsinhaber**

Dermapharm AG, Hünenberg

Diese Packungsbeilage wurde im April 2021 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



